

HURRICANE 5 GR

ΚΟΚΚΩΔΕΣ (GR)

Εγγυημένη σύνθεση:
Chlorpyrifos (Χλωπυριφός): 5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 94,85% β/β

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής, εφαρμοζόμενο κατά τη σπορά ή τη φύτευση, για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα τουλάχιστον 21 μέρες μακριά από την περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή.

Απαγορεύεται η βόσκηση μετά τη συγκομιδή του βαμβάκιου.

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκευαστικό ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί, η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνεύσει τη σκόνη. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλύνετε τα χέρια σας ενώπιον της ταξινόμησης.

ΠΡΟΣΕΥΒΟΛΗΣΗ - ΑΝΤΙΔΟΣ: Σε περίπτωση συχρίσματος, μην περιμένετε να εμφανιστούν συμπτώματα. Αργάτε αμέσως τις κατάλληλες διαδικασίες και αν εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα παραμελήστες χολινεργικές (ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή) (εξήγησε ότι το θύμα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο - δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέστε εμετό. Σε περίπτωση εισπνοής: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Αν η αναπνοή σταματήσει, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφρονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξεπλύσιμο για αρκετά λεπτά ακόμη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλύνετε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό, με σαπούνι, αποφεύγοντας το τρίψιμο. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε με άφρονο νερό με σαπούνι. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιασφαλισία. **Για τον νιπασμό:**

Το προϊόν περιέχει chlorpyrifos, έναν παρεμποδιστή χολινεργικής (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα και μπορεί να καταστείλει τη αναπνευστική λειτουργία). **Αντίδοτο:** Χορηγείται ατροπίνη σε περίπτωση ύπαρξης συμπτωμάτων, μέχρι την εμφάνιση συμπτωμάτων ατροπισμού και διατηρείται τα έως δύο όλο το οργανοφωσφορικό ε.ε μεταβολίτη. Οξείμωση το obidohime (Τοχογονίνη) ή obidohime chloride (2-PMAM), μπορεί να χορηγηθούν συμπληρωματικά, παράλληλα με την ατροπίνη, όχι όμως αντί αυτής.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Καλλιέργειες - Στόχοι - Δόσεις (κιλά σκευαστικού / στρέμμα) - Χρόνος και Τρόπος Εφαρμογής:

ΛΑΧΑΝΙΚΑ (πατάτζι, κάρτο, κρεμμύδι, τομάτα, πεπόνι, καρπούζι (1), κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, φασόλι, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, αλάτι, σπαραγγί, αγκινάρα, πράσο): Α) Εντομία εδάφους: **Αγροτιά, Πρασόγγουρας, Ζάβρος, Μηλοκλήνη, Χλωρόπας, Μυριάποδα:** Δόση: 2-2,5 κιλόγραμ. Για εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1 κιλόγραμ. κατά τη σπορά ή φύτευση σε γραμμές, αλυκές ή λάκκους φυτεύματος. Β) **Σιδηροκόλληση:** **Υάγρια:** Δόση: 5-6 κιλόγραμ. Πριν τη σπορά ή φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. **ΒΑΜΒΑΚΙ:** Α) Εντομία εδάφους: **Αγροτιά, Πρασόγγουρας, Ζάβρος, Μηλοκλήνη, Χλωρόπας, Μυριάποδα:** Δόση: 2-2,5 κιλόγραμ. Για εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,5 κιλόγραμ. κατά τη σπορά σε γραμμές, αλυκές ή λάκκους φυτεύματος. Β) **Σιδηροκόλληση:** **Υάγρια:** Δόση: 5-6 κιλόγραμ. Εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. **ΠΑΤΑΤΑ:** Εντομία εδάφους: **Αγροτιά, Πρασόγγουρας, Ζάβρος, Μηλοκλήνη, Χλωρόπας, Μυριάποδα, Σιδηροκόλληση:** Δόση: 5-6 κιλόγραμ. Για εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ:** Α) **Αγροτιά, Πρασόγγουρας, Ζάβρος, Μηλοκλήνη, Χλωρόπας, Μυριάποδα:** Δόση: 2-2,5 κιλόγραμ. Για εφαρμογή πριν τη σπορά ή φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,2 κιλόγραμ. κατά τη σπορά ή φύτευση σε γραμμές, αλυκές ή λάκκους φυτεύματος. Β) **Σιδηροκόλληση:** **Υάγρια:** Δόση: 5-6 κιλόγραμ. Πριν τη σπορά ή φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΑ:** Α) **Αγροτιά, Πρασόγγουρας, Ζάβρος, Μηλοκλήνη, Χλωρόπας, Μυριάποδα:** Δόση: 2-2,5 κιλόγραμ. Για εφαρμογή πριν τη σπορά με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,2 κιλόγραμ. κατά τη σπορά ή φύτευση σε γραμμές, αλυκές ή λάκκους φυτεύματος. Β) **Σιδηροκόλληση:** **Υάγρια:** Δόση: 5-6 κιλόγραμ. Πριν τη σπορά ή φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1,5 κιλόγραμ. κατά τη φύτευση σε γραμμές, αλυκές ή λάκκους φυτεύματος. Β) **Σιδηροκόλληση:** **Υάγρια:** Δόση: 5-6 κιλόγραμ. Πριν τη φύτευση με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- (1) Στο καρπούζι εφαρμόζεται και με δολομολίτη 1 γραμ.λάκκο φύτευσης.
- (2) Η εφαρμογή γίνεται με διανομέα κοκκιδίων που εφαρμόζονται στην στατική ή φυτευτική μηχανή ή με το χέρι.
- (3) Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλτε προσπάθεια για τη πλήρη ενσωμάτωση των κοκκίων που έπεσαν στα άκρα του χωματώφου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες): Πατάτα: 60 (αν χρησιμοποιηθεί κατά το παράγωγο). Λοιπές καλλιέργειες: Μη εφαρμογή (προφυτευτική εφαρμογή).

ΣΥΝΑΞΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευαστικά ή λιπάσματα. Εφαρμόζεται μόνο του.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδαφοκαλλιέργειες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομοίωμοφορο διασκορπισμός με το χέρι ή με διανομέα κοκκιδίων που προσαρμόζονται στην στατική-φυτευτική μηχανή και ενσωμάτωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΟΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κείμ μέσο συσκευασίας (στέγνωμα), ξεπλύνετε καλά με πηλίνο ή ήπιου ζεστού ζελέματος και πιά με το κούπιο που έτε καταπολέμηση προηγούμενης με σκόμια, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω ρύπανσης, ενσωματώνεται όλο σε σημεία αυλικών, για ανάλυξή της ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Διατηρείται στην αρχική του παραρτησιακή συσκευασία, σε χώρο ήπιο, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση: Εμπορικό κέντρο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος, Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



Αρ. Εγκ. Κυκλοφορίας : 1925/14.02.2002

Κάτοχος της έγκρισης: Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre, Deeside CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 1 ΚΙΛΟ

