

285x122 mm

POINTER 10 CS

Lambda Cyhalothrin (λάμδα σιαλοθρίν)

Μικροκάψουλες σε αιώρημα (CS)

Εγγυημένη σύνθεση: Lambda Cyhalothrin 9,53% β/β
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 90,07% β/β

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Το POINTER 10 CS κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει χορηγηθείσας άδειας παράλληλου εμπορίου με αρ πρωτ 410/5392/02.05.2014 από το ΥΑΑΤ. Είναι πανομοιότυπο με το σκεύασμα που παρασκευάζεται από την εταιρία SIPCAM SpA Ιταλίας και ήδη κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά δύναμει της με αρ 14462/12.09.2013 έγκρισης κυκλοφορίας ZIPPY 10 CS

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρά δι'επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

- Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
- Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Παρασκευαστής σκευάσματος: SIPCAM SpA, Ιταλία

Κάτοχος της έγκρισης παράλληλης εισαγωγής - Υπεύθυνος Κυκλοφορίας – Υποσυσκευαστής - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξροπήγδα, 19600 Μάνδρα Αττικής
τηλ.: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεο/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' ΦΑΣΗ ΒΛΠΕ.Θ. - Σίνδος
τηλ.: 2310 79 58 84, Fax: 2310 79 67 41



**ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ:
1 ΛΙΤΡΟ (1 LT)**

Τρόπος δράσης: Δρά στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά ιμηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώστε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε τρεις φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.

Φάσμα δράσης: Πεδίο εφαρμογής – Ασθένειες – Δόσεις (κ.εκ./στρ) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σιτάρι (μαλακό & ξηρό), Κριθάρι: Αφίδες, Σκαθάρι του σιταριού 15-20 Με την εμφάνιση έντονων προσβολών από το τέλος του αδελφώματος μέχρι το γάλα του καρπού. **Αραβόσιτος:** Πυραλίδα, Σποντόπτερα 10-25 Με την εμφάνιση έντονων προσβολών από την προβολή της αροσενικής ταξιδιανθής (φούντας) μέχρι του σταδίου της αρχής σκλήρυνσης των σπόρων. **Μαρούλι, Σαλάτα, Ρόκα, Φύλλα και βλαστοί λαχανοειδών, Σκαρόλα (μικρολίδα), Κάρδαμο, Λυκοτριβόλο:** Αφίδες 5-15 Με την εμφάνιση των προσβολών από το 3ο φύλλο μέχρι τον πλήρη σχηματισμό των φυτών. **Πατάτα:** Δορυφόρος 15-25 Με την έναρξη της προσβολής και το ξεδίπλωμα των πρώτων φύλλων μέχρι την ωρίμανση. **Λάχανο:** Πιερίδα, Πλουτέλλα, Πράσινο σκουλήκι, Μάμεστρα 7,5-15 Με την αύξηση του πληθυσμού των εντόμων από το 3ο πραγματικό φύλλο. **Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ):** Πράσινο σκουλήκι 10-25 Για τις αφίδες με την αύξηση του πληθυσμού τους. Για τους λοιπούς εχθρούς πριν το πρόβλημα καταστεί έντονο. **Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ φρουτ):** Αφίδες, Μύγα Μεσογείου 20-40 Με την εμφάνιση των προσβολών μετά την άνθιση μέχρι και την ωρίμανση των καρπών. **Πυρηνόκαρπα (Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά):** Μύγα Μεσογείου, Καρπόκαψα, Ανάρσια 10-25 Με την εμφάνιση της προσβολής από του σταδίου της καρπόδεσης μέχρι το μέσον του αναμενόμενου μεγέθους καρπών. **Ακρόδρυα (Φουντουκιά):** Βρωμιούσες 15-25 Με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο του καρπιδιού μέχρι την πλήρη ωρίμανση.

Παρατηρήσεις: 1) Να μην υπερβαιναίται η μέγιστη συνιστώμενη δόση 2) Η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έντονων προσβολών.

***Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτ/στρέμμα):** Σιτάρι/κριθάρι: 40-80, Αραβόσιτος: 20-100, Μαρούλι (και συναφή), Πατάτα, Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ): 50-100, Λάχανο: 40-100, Εσπεριδοειδή: 150-200, Πυρηνόκαρπα: 100-150, Ακρόδρυα: 70-100.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιερητική περίοδο/ Ελάχιστο διάστημα μεταξύ των εφαρμογών σε ημέρες: Σιτάρι, Κριθάρι, Πατάτα: 2/14, Αραβόσιτος, Λάχανο, Ακρόδρυα: 2/10, Μαρούλι (και συναφή), Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα: 2/7, Εσπεριδοειδή: 3/7, Πυρηνόκαρπα: 3/10.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Σιτάρι/κριθάρι 28, Αραβόσιτος 15, Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα 3, Μαρούλι (και συναφή), Λάχανο, Εσπεριδοειδή, Ροδάκινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηλιά, Φουντουκιά 7, Πατάτα 14.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τριπλή ή σχίσμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο (2) χρόνια.

HM ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

HM ΛΗΞΗΣ:

AP ΠΑΡΤΙΔΑΣ:



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. • Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. • Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικινδύνια απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ/ ΑΝΤΙΔΟΤΟ: • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε σε γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό, ακολουθούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι σαπούνι. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό χώρο. Καλέστε προληπτικά γιατρό. • Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το Τεχνικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: 210 7793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΕΥΓΕΙΑ Η ΕΠΙΧΑΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

[Μην καθαρίζετε τα μέσα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους θρόμους]. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Η δραστική ουσία του σκευάσματος είναι πολύ τοξική για τα αρσενικά αρθροπόδα. Επικίνδυνο για τις μέλισσες ή να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάστας μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζώων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζώα πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφιέρωση μίαν αφέαση (ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα: 12 μέτρων για μαρούλι και λάχανο, 15 μέτρων για σιτάρι, κριθάρι, 20 μέτρων για αραβόσιτο 30 μέτρων για εσπεριδοειδή, ροδάκινια, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηλιά, φουντουκιά

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπο τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή κ ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το POINTER 10 CS. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μη μπαίνει στις ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή. • Για γεωργικές εργασίες μεταξύ 24 και 48 ωρών από την εφαρμογή, να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα. • Να εμποδίζετε την πρόσβαση των οικόσπιτων ζώων στις περιοχές που έχουν ψεκασθεί πριν παρέλθει ο χρόνος αναμνήσης.