

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα/οπινήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Εάν ζητίσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέστε εμετό. Εάν ζητήσετε από τον γιατρό να μην προκληθεί η επικίνδυνη απορρόφηση, προσοχή να μην γίνει πνευμονική αναρρόφηση. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν χρειαστεί συμβουλευθείτε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Τα παράγωγα αδρεναλίνης αντενδείκνυται. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα δεν πρέπει να συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα. Η εφαρμογή αυτών θα πρέπει να γίνεται 8-10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκεύασμάτος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκεύασμάτος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία και σε θερμοκρασίες 20-30 °C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



KEYLOFOP 36 EC

Diclofop-methyl (Ντικλοφόπτ-μεθύλ) 36%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Diclofop-methyl 36 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 64,16 % β/β

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΕ ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει άλλοργική δέρματική αντιδράση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΛΙΤΡΟ

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 7850/ 30-01-2008



Συνδιανομέας:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 1960 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Κάτοχος της Έγκρισης:
SAPEC AGRO S.A., Alameda dos Oceanos lot. 1.0.6.1.1-3ο
A Parque das Nações, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρική: Θέση Ντρόζεζα (Β/Π.Α.), 190 11 Αιγάλεω Αττικής,
Τηλ.: +30 22950 29350-4, Fax: +30 22950 29305
Υποκατόπτυμα Βορείου Ελλάδος: ΒΙΠΕΘ. Ο.Τ. 42, Δ.Α. 11,
Τ.Θ. 174, 570 22, Σίνδος Θεσσαλονίκης,
Τηλ.: +30 2310 788002-3, Fax: +30 2310 799840

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Για επήσια αγρωτώδη ζιζάνια εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων και δεν έχουν καλυφθεί από την καλλιέργεια.

Καρότο: Δόση 350 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 40-50 λίτρα/στρ. **Λάχανο, Φασόλι:** Δόση 300 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-60 λίτρα/στρ. **Πατάτα:** Δόση 250-300 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. **Σιτάρι (μαλακό και σκληρό):** Δόση 250 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. **Κριθάρι:** Δόση 200-250 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ. **Ζαχαρότευτλα, Καπνός:** Δόση 300 κ.εκ./στρ. και όγκος ψεκ. υγρού 30-50 λίτρα/στρ.

Μένιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή για όλες τις καλλιέργειες.

Παραπρήσης: 1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: *Anrena* spp. (αγριοβρώμη), *Echinocloa crus-galli* (μουχρίτσα), *Phalaris* spp. (φάλαρη), *Milium vernale* (μύλιο), *Setaria* spp. (σετάρια), *Digitaria sanguinalis* (αιματόχορτο), *Lolium multiflorum* (πολύανθη τρια), *Eleusine indica* (ελευσίνη) κ.ά. Επίσης καταπολεμά *Sorghum halepense* (βέλιουρα) που προέρχεται από σπόρο. 2. Στο κριθάρι να εφαρμόζεται η δόση των 250 κ.εκ. στο στρέμμα σε περίπτωση μεγάλης προσβολής από αγριοβρώμη. 3. Στην πατάτα εφαρμόζουμε τη μεγάλη δόση στην περίπτωση μεγάλης προσβολής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2 ή 3 φύλλων. Η εφαρμογή είναι ανεξάρτητη από το στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών, αλλά ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής εξαρτάται και καθορίζεται μόνο από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζάνιων. Πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 atm. (45 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 2/3 με νερό. Προσθέτουμε την απατούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται τρεις φορές και τα νερά ρίχνονται στο ψεκαστικό διάλυμα. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Ειδικές προφυλάξεις: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπαστά και σπόρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αξεδάνετε τις δόσεις. Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό στο οποίο μπορεί να προστεθεί διαβρεκτικός παράγοντας για καλύτερη απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ψεκαστικού διαλύματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν εφαρμόζεται.