

# KILLER AB

BRODIFACOUM (ΒΡΩΔΙΦΑΚΟΥΜΗ) 0.005%

## ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ (AB)

Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0.005% B/B

Αριθ. Εγκρ. Κυκλοφ. (ΥΑΑ&Τ): ΤΠ14-0102 / 13-10-2015

Βοηθητικές ουσίες 99.995% B/B.

Περιέχει τον πικραντικό-απορρηκτικό παράγοντα: denatonium benzoate. Χρώμα: μπλε.

## ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ)

Τρωκτικοκτόνο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποτικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (μόνο γύρω από κτίρια) χώρους.



**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Η πώληση του επιτρέπεται από καταστάματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) αλλά μακριά από τρόφιμα και καλλυντικά.

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Το KILLER AB χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποτικών (*Mus musculus*) και των αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (μόνο γύρω από κτίρια) χώρους.

**ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** α) **Μη επαγγελματική χρήση:** Για χρήση κατά των ποτικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση εναντίων αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για τους αρουραίους και τους ποτικούς, το δολώμα θα πρέπει να παρέχεται συσκευασμένο, περιεχόντων την ποσότητα δολωματος που απαιτείται για ένα σημείο δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποτικό). Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / Τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται χειρωνακτικά στην προβλεπόμενη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Μην ανοίγετε τα φακέλλια με το δολώμα. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία. β) **Επαγγελματική χρήση:** εντός δολωματικών σταθμών ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.

**ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για προσβολές από ποτικούς χρησιμοποιείστε μέχρι 50 γρ. δολωμάτων ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή. Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε μέχρι 100 γρ. δολωμάτων ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή. Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συχνότητα κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση του. Για να ελεγχθεί η εξάλειψη της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντισπασμικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:** α) **Μη επαγγελματική χρήση:** Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν από κάθε γεύμα και μετά την εφαρμογή. Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους. Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δολώμα από παιδιά, πνύτα και ζώα μη στόχους (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά). β) **Επαγγελματική χρήση:** Για την επιλογή του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του στοχευόμενου πληθυσμού. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες μόνο όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (προβλεπόμενος EN 374). Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαττώνεται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή άλλα ζώα. Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δολώμα από παιδιά, πνύτα και ζώα μη στόχους (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά). γ+δ) **Μη επαγγελματική & επαγγελματική χρήση:** Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιστούν με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν. Εκτός και αν υπάρχει επίδραση από επαγγελματίες χρήστες, τα αντισπασμικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός νόμιμου δολώματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντισπασμικό δολώμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών. Εφόσον η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται μετά το πέρας των 35 ημερών, θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (εκτός της χρήσης σε υπνοδωμάτια), τουλάχιστον κάθε φορά που ελεγχετε καλή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις. Μην απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισυναντίζονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντισπασμικά τρωκτικοκτόνα όπως επίσης και οι πρώτες βοηθήσεις σε περίπτωση τροφικοκτονίας. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην προσβάλλονται.

**ΑΠΟΛΥΤΟ:** Βιταμίνη Κ1 (υπό ισχυρή προκαλούμενη).

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.** Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών.

**ΣΥΝΗΘΕΣ ΑΠΟΗΓΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΟΗΓΚΗΣΗΣ:** Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το μακριά από το φως. Χρονική διάρκεια σταθερότητας εντός της συσκευασίας μέχρι 2 χρόνια.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:** • Μακριά από παιδιά. • Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. • Φυλάσσετε κλειδωμένο. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια (μόνο για επαγγελματίες χρήστες). • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:** Η βρωδιφακούμη (brodifacoum) είναι ένα αντισπασμικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία. Η έμφραξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση των περισσότερων των σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόλη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 µg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλέβια) για αρκετές εβδομάδες.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777

Παρασκευαστής σκευάσματος:

ZAPI S.p.A., via Terza Strada, 12, 35026 Conselve (Padova), ITALY

Κάτοχος της έγκρισης - Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση - Διάθεση:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Εργοστάσιο, 19600 Μάνδρα Αττικής, Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100

Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ Φάση, ΒΙΠΕ.Θ. - Σίνδος, Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741

www.ellagret.gr



Καθαρό βάρος (Net weight):

**500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ (gr)**

(περιέχει δολώματα σε σακουλάκια των 50 γραμμαρίων)

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date):

Αριθμός Παρτίδας (Lot No.):

