

REVIVAL 505

Cymoxanil (Σιμοξανίλ) + Mancozeb (Μανκοζέμπ)

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60408/06.03.2014

Εγγ. σύνθεση: Mancozeb 46,5% β/β + Cymoxanil 4% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 41,1% β/β

**Μείγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός τοπικά
διασυστηματικού (cymoxanil) και ενός επαφής
(mancozeb) με προληπτική και θεραπευτική δράση.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ -

ΔΟΣΕΙΣ (γρ. σκευάσματος ανά στρέμμα) -

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): **Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*)**. Δόση: 240-300 γρ./στρ. Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο-Σεπτέμβριο BBCH 11-79.

ΠΑΤΑΤΑ: **Περονόσπορος (*Phytophthora infestans*)**. Δόση: 240-300 γρ./στρ. Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο-Σεπτέμβριο BBCH 10-91.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λιτ./στρέμμα):

Αμπέλι: 30-60, Πατάτα: 30-50.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι: 4, Πατάτα: 4.

Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7-10 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το REVIVAL 505 δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιεργείες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφωπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα): 28 ημέρες, Πατάτα: 21 ημέρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (σακούλες μαζί με τα κουτιά και οι σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτιθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό χώρο, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2 χρόνια).

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Αποφύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Περιέχει mancozeb και cymoxanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκευάσμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 5 μέτρων για την καλλιέργεια της πατάτας και 5 μέτρων + ακροφύσια μείωσης διασποράς 50%, για πρώιμες εφαρμογές και 5 μέτρων + ακροφύσια μείωσης διασποράς 75%, για όμιμες εφαρμογές στο αμπέλι ή αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων με συμβατικά ακροφύσια, για το αμπέλι.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μη χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκευάσμα. Πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Κάτοχος της άδειας:

Indofil Industries Limited, Via Filippo Turati 6,

20121 Milan, Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.,

θέση ΝΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ), 190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ



Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομέας:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Επρωτήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ. 210 5550431 - Fax: 210 5556100
Θεσ/νική: 53 Ο.Τ., Γ' Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
Τηλ. 2310 795884 - Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1250gr