

# ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 1DP

ΣΚΟΝΗ ΕΠΙΠΑΣΗΣ (DP)

COPPER OXYCHLORIDE + SULPHUR  
(ΘΕΥΧΔΡΟΙΟΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ + ΘΕΙΟΣ)

Εγγυημένη σύνθεση : Μεταλλικός χαλκός 4% σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού  
Sulphur 40% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 52,65% β/β

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αναπνέαται σκόνη. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μέταν / πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμβουνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκένασμα ή τα κενά της συσκευασίας του.

### ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Μήν χορηγείτε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών είναι αναθίθησης - Εάν ζητήσετε αιτητική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την επικέτα - Συντομοευθέτηση / Επισκεφθείτε γιατρό έων αισθανθείτε αδιαθεσία (δεξιές την επικέτα εάν είναι δυνατόν). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Αφριπέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μαλουμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ : Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ : Δεν υπάρχει ειδικό αντόδοτο. ΓΙΑΤΡΟΙ : Ακολουθήστε θεραπεία συμπληκτική, ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 77 93 777

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης στο συνθρόνου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκένασμα: Κρατείστε τα παραγματικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής : Με επίτιπση ως έχει.

Φυτοτοξικότητα : Είναι φυτοτοξικό σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28°C).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκο), αφού κατατεράρουν προηγουμένως με σκύρο, για τη διασφάλιση της μη περιερέπερη χρήσης, εναποτίθενται σε σημείο ασύλληψης, για ανακύκλωση ή άνακτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αργική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

### ΠΡΟΣΟΧΗ



- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
- Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:  
60814/31.12.2018

Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για τη τελική διάθεση στην αγορά  
Παρασκευαστής - Διανομή:



ΕΠΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ  
Όσηση Επροπίγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431, 210 5556100  
[www.ellagret.gr](http://www.ellagret.gr)

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής

Αμπέλι (για επιπρατέζια και οινοποιησίμα σταφύλια) : ΩΙΔΙΟ: Εφαρμογές α. Όπαν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10εκ., β. κατά την άνθιση, γ. μετά το δέσιμο των ραγών και δ. κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του "γυαλίσματος" των ραγών και ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 2-2,5 κιλά/στρέμμα.

Λαχανικά (Υ+Θ) (Τομάτα, Μελιτζάνα, Κολοκύθη, Αγγούρι): ΩΙΔΙΟ: Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας. Περονόβατός: Εφαρμογές στο στάδιο των νεαρών στορόφυτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας. Δόση: 2-3 κιλά/στρέμμα.

Πεπόνι, Καρπούζι (Υ+Θ): ΩΙΔΙΟ: Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας. Δόση: 2-3 κιλά/στρέμμα.

Πατάτα: ΩΙΔΙΟ: Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας. ΠΕΡΟΝΟΣΤΙΠΟΡΟΣ: Εφαρμογές στο στάδιο των νεαρών στορόφυτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της ασθένειας. Δόση: 2-3 κιλά/στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:

Αμπέλι: 4, Τομάτα, Μελιτζάνα, Κολοκύθη, Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι, Πατάτα: 2 με μεσοδιάστημα επεμβάσεων 15 μέρες.

Παραπρήσεις: 1) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούμεια ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκένασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Το θειάρι δεν δρά σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 18°C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι: 21 ημέρες. Τομάτα, Μελιτζάνα, Κολοκύθη, Αγγούρι: 7 ημέρες. Πεπόνι, Καρπούζι, Πατάτα: 21 ημέρες.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΚΙΛΟ