

200X100mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανόμηση / φόρτωση και τον ψεκασμό. «Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αέρα αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια». Διάθεση περιεχομένου / περιεκτι συμφώνα με την Εθνική Νομοθεσία. Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά υδρά. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αδιάστατη ζώνη προστασίας από επιφανειακά υδρά: - 10 μέτρων, σε αμπέλι, - 15 μέτρων, σε εσπεριδοειδή, - 20 μέτρων, σε μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά και νεκταρινιά. Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μίαν αδιάστατη ζώνη προστασίας από ακαλλιέργητες εκτάσεις: - 5 μέτρων, σε αμπέλι - 10 μέτρων, σε εσπεριδοειδή, μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά και νεκταρινιά. Επικινδύνουν για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονιάσης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Σε καλλιέργειες θερμοκηπίου θα πρέπει να περάσουν 4 ημέρες από την εφαρμογή του σκευάσματος και την εξαπόλυση εντόμων επικονιάσης στα θερμοκήπια και 14 ημέρες για την εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων. **Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστάμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογενείς ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί: Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδαφικές καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοεμβρίου-Φεβρουάριου), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ακαρεοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Χρονικά διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυθίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο (2) φορές με καθαρό νερό.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδύοντας, συμμετρώνουμε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ζεπάμμα (τα νερά του ζεπάμματος το ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τριπλά, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να αναποστειθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης – Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ηλ. Παραγωγή (Manuf. Date):
Αρ. Παρτίδας (Lot. No):



ΛΑΟΤΤΑ

Abamectin (Αμπαμεκτίν)
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

1.8 EC

Εγγυημένη σύνθεση: Abamectin 1.8% B/0
Βοηθητικές ουσίες 97.8% B/0

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιδηθείς σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί σοβαρά οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανληνόμενη έκθεση. Πιθανό τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή ακάμιο.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14.607/05-05-2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500κ.εκ

Κάτοχος της άδειας: LAINCO S.A., Pol. Ind. Can Jardí, Avda. Bizet, 8-12 08191 Rubí, Barcelona, Ισπανία.
Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗ Α.Ε.
Μεουσίου 9, 106 74 Αθήνα
Διανομή:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηρολιγιάδα, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

04/2021

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασπία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΓΚΡΕΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΦΡΑΠΑ, ΚΙΤΡΟΛΕΜΟΝΙΑ, ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ, ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ: Με την εμφάνιση της προσβολής (κατά την βλάστηση και κατά το δάσιμο των καρπών). Για Φυλλοκιάση δόση 40 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (30-80 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα/στρέμμα). Για Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο των εσπεριδοειδών, Παραμορφωτικό άκαρι δόση 40 κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού (40-80 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-200 λίτρα/στρέμμα. **ΜΗΛΙΑ:** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. Για Κίτρινο τετράνυχο και Κόκκινο τετράνυχο δόση 80 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (60-96 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 75-120 λίτρα/στρέμμα. **ΑΧΛΑΔΙΑ:** Από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση, με την εμφάνιση της προσβολής. Για Ψάλλα δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (37.5-120 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 75-120 λίτρα/στρέμμα. Για Κίτρινο τετράνυχο και Κόκκινο τετράνυχο δόση 80 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (60-96 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 75-120 λίτρα/στρέμμα. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ:** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. Για Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο, *Byobia rubicollis* δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (50-120 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-120 λίτρα/στρέμμα. **ΑΜΠΕΛΙ (Οινοπώσιμα σταφύλια):** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση). Για Κίτρινο τετράνυχο δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (25-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 50-100 λίτρα/στρέμμα. **ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια (2)).** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών (να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση). Για Κίτρινο τετράνυχο δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (50-120 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100-120 λίτρα/στρέμμα. **ΦΡΑΟΥΛΙΑ (Θ):** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για Κίτρινο τετράνυχο, *Phytonemus pallidus* με δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Για Λιριόμυξα με δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. **TOMATA (Υ):** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για Κίτρινο τετράνυχο, *Polyphagotarsonemus latus* με δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. **ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ (Θ), ΠΕΠΟΝΙ (Θ+Υ), ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Θ+Υ), ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (Θ+Υ):** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για Λιριόμυξα με δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. **TOMATA (Θ):** Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για Κίτρινο τετράνυχο, *Ergorythidae*, *Polyphagotarsonemus latus* με δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Για Λιριόμυξα με δόση 50-100 κ.εκ./100 lt ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί. 2. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή Σταφίδα.
Μεικτές συνθέσεις εφαρμογής ανά καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): Γκρέπ φρούτ, Λεμόνια, Μανταρίνια, Πορτοκάλια, Φράπα, Κιτρολέμονια, Πέργαμοντα, Νεράντζα, Τομάτα (Θ+Υ), Μελιτζάνα (Θ+Υ), Μοσχοκίβδη (Θ), Αγκούρι (Θ), Αγγούρια (Θ), Πεπόνια (Θ+Υ), Καρπούζια (Θ+Υ), Κολοκύθα (Θ+Υ), 1-37, Αχλαδιά, Μηλιά: 1-215, Αμπέλι (οινοπώσιμα και επιτραπέζια σταφύλια), Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 1, Φράουλα (Θ), Κολοκύθα (Θ), Αγκούρι (Θ), Αγγούρια (Θ+Υ), Καρπούζια (Θ+Υ), Κολοκύθα (Θ+Υ), 1-27.
Τελικώς επιβεβαιώνεται πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Εσπεριδοειδή: Αμπέλι (οινοπώσιμα και επιτραπέζια ποικιλίες): 10, Αχλαδιά, Μηλιά, Τομάτα (Θ+Υ), Μελιτζάνα (Θ+Υ), Κολοκύθα (Θ), Αγκούρι (Θ), Αγγούρια (Θ), Πεπόνια (Θ), Καρπούζια (Θ), Κολοκύθα (Θ), Φράουλα (Θ), 3, Πεπόνια (Υ), Καρπούζια (Υ), Κολοκύθα (Υ), 5, Μοσχοκίβδη (Υ), Αγκούρι (Υ), Αχλαδιά (Υ), Αγγούρια (Υ) 1-215, Αμπέλι (οινοπώσιμα και επιτραπέζια σταφύλια), Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 14.