

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρίψτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ Η ΕΜΕΝΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΛΕΣΤΕ ΠΑΤΡΟ Η ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. **Επαφή με τα μάτια:** Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Σε επαφή με το δέρμα:** Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντος ή ατμών, φλόγας ή ψεκαστικού υγρού απομακρύνετε άμεσα το παθόντα από την περιοχή έκθεσης, διατηρήστε τον ζεστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή καλέστε αμέσως γιατρό. Υπόγειο κίνδυνο προϊόν να εισέλθει στους πνεύμονες σε περίπτωση εμετού μετά από κατάποση. Σε αυτή τη περίπτωση ο παθών θα πρέπει να εισαχθεί αμέσως σε νοσοκομείο. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. **Προστασία για τους παρέχοντες πρώτες βοήθειες:** Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας. Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτό. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα: 15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμυγδαλιά, φασόλια, καρυδιά, ροδιά και ακτινίδια. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθησή/όταν οι μέλισσες είναι ενεργές/όταν υπάρχουν ανθομήματα ζίζανια. Μη εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή πριν οι ενυποθέσεις του ψεκαστικού υγρού έχουν στεγνώσει τελείως. Για να αποφυγείτε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι την μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Τα ψεκαστικά μηχανήματα εφαρμογής πρέπει να ξεπλένονται με νερό και τα νερά του ξεπλύματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επόμενη εφαρμογή.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας. Να αποφεύγετε η παρουσία προσώπων που δεν είναι απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του πιθανούς τρόπους ανάφλεξης (κάπνισμα, δημιουργία σπινθήρων - φλόγας) στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος. Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω σε χυμένο προϊόν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι άδειοι περιέκτες (φιάλες, δοχεία) θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό υπό πίεση ή να υφίστανται τρίπλο ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος χρησιμοποιούνται στο ψεκαστικό διάλυμα).

Στη συνέχεια καταστρέφονται με τρύπημα για την διασφάλιση ότι δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό και συλλέγονται για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει τελείως.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμογή.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό για τις συνθήκες της Ελλάδος όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις. Δεν αναμένονται επιπτώσεις σε φυτά μη στόχους. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας, ή όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το SCORPION EC παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε εσωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Ημερομηνία παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας.
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας.

SCORPION EC



Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil 96,9% β/β, CAS No 64742-46-7
Βοηθητικές ουσίες 3,1% β/β

Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο ενάντια σε τετράνυχους, κοκκοειδή και αφίδες

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 1 ΛΙΤΡΟ

BIO

Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14.624/17.10.2017

Παρασκευαστής σκευάσματος: TOTAL Fluides S.A.S. France.
Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπηγάδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετράνυχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακαριών, προνυμφών και ωών).

Καλλιέργειες - Στόχοι - Δόσεις - Χρόνος Εφαρμογής: ΕΠΕΡΙΔΡΟΙΕΙΔΗ (Γκρέιπφρουτ, λεμονιά, μαυριανιά, πορτοκαλιά, φράπα) • **Κόκκινη ψώρα, Ψευδοκοκκος, Λεκάριο, Άσπρη ψώρα, Μαύρη ψώρα, Άλλα κοκκοειδή, Τετράνυχος, Αλευρώδεις.** Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται 2 εφαρμογές ανά 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή). Για *Aleurathrix floccosa* μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης με 60 ημέρες μεσοδιάστημα. **ΜΗΛΟΙΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά): **Ψώρα Σαν Ζοζέ, Παρλατόρια, Βαμβακάδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Σταχτιά ψώρα, Φυλλοδέτες, Τετράνυχος, Ψύλλα, Αφίδες, Ψευδοκοκκος***, **Ψώρες***, **Ματόψειρα***. Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται 2 εφαρμογές ανά 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή). **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, δαμασκηνιά): **Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα, Σφαιρολεκάριο, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδέτες, Ακάρεα.** Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται 2 εφαρμογές ανά 60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή). **ΑΜΠΕΛΙ:** Χειμερινά υά του **Κόκκινου τετράνυχου, Κοκκοειδή.** Δόση 1800 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1080 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή στα χειμερινά στάδια ΒΒСН 00-11 της καλλιέργειας. Συνιστάται μία εφαρμογή. **ΕΛΙΑ*** **Ακάρεα, Παρλατόρια, Λεκάριο, Πολλίνα, Άσπρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Ψώρες, Βαμβακάδα.** Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.εκ./στρ. ή μία με 2000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές με μίν μεσοδιάστημα 14 ημέρες. **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ***: **Ψώρα σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα ή Διάσις, Λεκάριο, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη ψώρα, Κηροπλάστης, Ψώρες, Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Παραμορφωτικό άκαρι, Ακάρεα, Αφίδες, Φυλλοδέτες.** Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.εκ./στρ. ή μία με 2000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές με μίν μεσοδιάστημα 2 ημέρες. **ΚΑΡΥΔΙΑ***: **Κόκκινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Ακάρεα, Κοκκοειδή, Λεκάριο, Κηροπλάστης.** Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.εκ./στρ. ή μία με 2000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές με μίν μεσοδιάστημα 2 ημέρες. **ΚΑΡΥΔΙΑ***: **Κόκκινος τετράνυχος, Κίτρινος τετράνυχος, Ψώρα, Ψώρα Σαν Ζοζέ, Ακάρεα.** Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (δύο εφαρμογές με 1000 κ.εκ./στρ. ή μία με 2000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές με μίν μεσοδιάστημα 2 ημέρες. **ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ***: **Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμβακάδα ή Διάσις, Κηροπλάστης.** Δόση 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (500 κ.εκ./στρ.). Μία εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:** 1) Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειοβασβετίου. 2) Στα μηλοειδή και ειδικά στο κυρτάλλι να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενωσθεν σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. *Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδοχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά και ακτινίδια καθώς και για την αποτελεσματικότητά τους των εχθρών ή οσσοσ σημάσιος από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές απουσίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοτοξικότητά από τη χρήση του σκευάσματος. *Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: Για αμπελί 60 λίτρα / στρέμμα, για ακτινίδια 50 λίτρα/στρέμμα, για τις υπόλοιπες καλλιέργειες 100-150 λίτρα / στρέμμα. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείαις ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π. Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%. Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.