

# BONITOR Next Pasta Fluo

DIFENACOU (ΔΙΦΕΝΑΚΟΥΜΗ) 0,0029%  
ΕΤΟΙΜΟΧΡΗΣΤΟ ΔΟΛΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ (RB)

## ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ)

Ετοιμόχρηστο ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟ (ΒΙΟΚΤΟΝΟ) δόλωμα σε μορφή πάστας (RB) που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών και των καφέ αρουραίων σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).

### ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



**BONITOR Next Pasta Fluo**  
**Ετοιμόχρηστο**  
**τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε**  
**μορφή πάστας (τύπος**  
**προϊόντος 14)**  
**Εγγυημένη σύνθεση**  
Difenacoum 0,0029% B/B  
Βοηθητικές ουσίες  
99,9971% B/B  
Περιέχει τον  
πικραντικό-αποτρεπτικό  
παράγοντα:  
denatonium benzoate  
Χρώμα: ανοιχτό κόκκινο  
**Διπλώσεις επικινδυνότητας**

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα)**  
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  
**Διπλώσεις προφύλαξης**  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P202: Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και  
κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P270: Μην τρώτε,  
πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280:  
Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P308+P313: ΣΕ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/  
Επισκεφθείτε γιατρό. P314: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε  
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P405: Φυλάσσεται  
κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε  
εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης.

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το BONITOR Next Pasta Fluo είναι ένα αντιπηκτικό ετοιμόχρηστο τρωκτικοκτόνο δόλωμα σε μορφή πάστας που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση όλων των σταδίων ανάπτυξης των οικιακών ποντικών (*Mus musculus*) και των καφέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*) σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).

#### ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:

Κατηγορία χρηστών: Επαγγελματίες χρήστες.

Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. α) Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. β) Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

• **Ποντικοί** (*Mus musculus*):

-Υψηλή προσβολή: μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα.

-Χαμηλή προσβολή: μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.

• **Αρουραίοι** (*Rattus norvegicus*):

-Υψηλή προσβολή: μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.

-Χαμηλή προσβολή: μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα.

Αριθ. Έγκρ. Κυκλοφ. (YAAT): ΤΠ14-0128 / 4-10-2017

Κάτοχος της έγκρισης-Παρασκευαστής σκευάσματος:

**ZAPI S.p.A.**, Via Terza Strada 12, 35026 Conselve

(Padova), ITALY (Tel: +39 049 9597737)

Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης-μυοκτονίας.

Καταστήματα πώλησης: καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.



Αποκλειστική  
Διάθεση:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Επροπύλαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
www.ellagret.gr

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

### Γενικές οδηγίες:

• Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν τα χρησιμοποιήσετε. • Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους με σκοπό να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής. • Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολώματος. • Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μετρώων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου. • Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε χώρους όπου έχει παρατηρηθεί προηγούμενος δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι άσπησης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.). • Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές. • Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή επισημάνση ότι περιέχουν τρωκτακτοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται. • Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοηθείες σε περίπτωση δηλητηρίασης. • Το δόλωμα πρέπει να ασφαρίζεται ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το δολωματικό σταθμό. • Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους. • Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. • Μην φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσο εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. • Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την επιθεώρηση στην αρχή της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. • Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την αντικατάσταση των σημείων δολώσης σε διαφορετικές θέσεις και τη πιθανότητα αλλαγής με άλλο τύπο δολώματος. • Εάν μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών, τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά είδη τρωκτικών και θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου. Επίσης εξετάστε τη χρήση παγιδιών ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. • Για το δόλωμα σε φακελάκια: Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα. • χρησιμοποιείτε μια σπάτουλα μετά την εφαρμογή (για καθαρισμό/απόρριψη) του δολώματος. • Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. τους χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών. • Οι πληροφορίες για το προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς ότι: το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»). • Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία. • Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής (εκτός της μόνιμης δόλωσης). • Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή ασθενέστερη δράση για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για εναλλαγή, λάβετε υπόψη τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτοκτόνου. • Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τις κατασκευές των καλυμμένων και προστατευμένων σημείων δόλωσης μεταξύ των εφαρμογών. • Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### Οδηγίες χρήσης για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους:

• Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. • Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών. • Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτσια τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής. • Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. • Η μόνιμη δόλωση περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με αυξημένη πιθανότητα εκ νέου προσβολής και όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς. • Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της εκτίμησης του κινδύνου για εκ νέου προσβολή. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης. • Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης υδάτων, εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό.

### Οδηγίες χρήσης για εφαρμογή σε εξωτερικούς (γύρω από κτίρια) χώρους:

• Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετείστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας. • Αντικαταστήστε τα δολώματα στα σημεία δόλωσης που έχουν καταστραφεί από υγρασία ή λερωθεί. • Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. • Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε μη στοχευόμενα είδη. • Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών. • Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτσια τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής. • Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής. • Η μόνιμη δόλωση περιορίζεται αυστηρά σε τοποθεσίες με αυξημένη πιθανότητα εκ νέου προσβολής και όταν άλλες μέθοδοι ελέγχου έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς. • Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών (IPM) και της εκτίμησης του κινδύνου για εκ νέου προσβολή. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης. • Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια. • Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε επιφανειακά υδάτα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, αρδευτικά κανάλια) ή συστήματα αποστράγγισης υδάτων, εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό.

### ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΤΕΣ Η ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

• Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

• **Αντίδοτο:** Βιταμίνη K1 που χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

• Σε περίπτωση:

–Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με νερό και σαπούνι.

–Έκθεσης των οφθαλμών, ξεπλύνετε τα μάτια με οφθαλμικό υγρό ή νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

–Κατάποσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Μην χρησιμοποιείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

• **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777.**

• Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο. • Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με την ακόλουθη πληροφορία: "μην μετακινείτε ή ανοίγετε", "περιέχει τρωκτοκτόνο", "όνομα προϊόντος ή αριθμός άδειας", "δραστική(-ες) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων". • Επικοινωνήστε για τα άγρια ζώα.

### Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:

• Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. • Συνιστάται η χρήση γαντιών.

### Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:

• Φυλάξτε το σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. • Φυλάξτε το σε χώρους μακριά από την πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής. • Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

### Άλλες πληροφορίες:

• Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος. • Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθένειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε. • Αυτό το προϊόν περιέχει μια μικροκρυσταλλική ουσία και μια χρωστική.

**Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date) :**

**Αριθμός Παρτίδας (Lot No.) :**

**Καθαρό Βάρος (Net weight): 5 ΚΙΛΑ (Kg)**  
**(περιέχει δολώματα/φακελάκια των 10 γραμμαρίων)**

**ΜΗΝ ΣΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**