

# FLUAZINOVA®

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Fluazinam (φλουαζινάμ)

Εγγυημένη σύνθεση: Fluazinam 50% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 60,45% β/β

## ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ  
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αρ. Άδειας Κυκλοφορίας: 60723 / 03-12-2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 ΛΙΤΡΑ



Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά -  
Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Επροτήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100  
[www.ellagret.gr](http://www.ellagret.gr)

Κάτοχος της άδειας: Finchimica S.p.A.  
Via Lazio 13, 25025 Manerbio (BS), Ιταλία



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις επικινδυνότητας: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει Fluazinam. Υπόπτο για την πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Το Fluazinam παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλώσης.

Πεδίο εφαρμογής – Στόχος – Δόσης – Χρόνος εφαρμογής:

ΠΑΤΑΤΑ: Για Περιστόπορο δάσος 30-40 κ.εκ./στρ. Όγκος ωκ. υγρών 20-20 εκ. (BBCH 40-97).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 10 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.

Παρατηρήσεις: 1. Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής. Σε περίπτωση μοχρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα. 2. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί κάλυψης. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινείστε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκεύασμάτων στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε στη συνέχεια με το υπόλοιπο απαιτούμενο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Δηλώσεις προφύλαξης: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην το χρησιμοποιήσετε πιριν διαβάσετε και κατανοήστε τις οδηγίες προφύλαξης. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονοδιών / ατμούς / εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα απομήκης προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδύμασιά, μπότες και μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμειχφρότωση και κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδύμασιά εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής σύντομα μετά τον ψεκασμό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιεκτή συμφωνημένη με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν αμέσωστη ζώνη προστασίας, με φυτική κάλυψη, 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότης έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Εποικεθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφρονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξανθήματα: Συμβουλευθείτε/ Εποικεθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε αμέσως με άφρονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επιστονής: μετακινήστε τον ασθενή στον κοθαρό αέρα. Αν παρατηρηθούν αναπνευστικές δυσκολίες, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση καπνάσης: ξεπλύνετε το σώμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπλωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχόλαστο το βιτόι και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό, αφαρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στην συνέχεια ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιλές ή δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό έπιλυμα (τα νερό της ξεπλύνματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπαμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 7 ημέρες

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγειας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλείστε: Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή με σκεύασματα διαφορετικών χημικών ορμάδων και διαφορετικού τρόπου δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 48 ώρες από την εφαρμογή.

Χρονική σταθερότητα του σκεύασμάτος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαση συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  
ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ