ΝΕΟ ΚΟΡΤΙΚΟ
205x105mm

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

072019

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα. «Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. Να αερίσετε τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα μέχρι να στεγνώσει το προϊόν πριν ξαναμπείτε. Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν ψψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων. Μην προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε ασθενή που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

DOURO 10 EC

Penconazole (πενκοναζόλ) 10%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Penconazole 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 89,6% β/β

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση

Ανήκει στην ομάδα των Τριαζολών (DIMs) και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Α.Α.Δ.Α.: 60874/26-06-2019

Κάτοχος της άδειας: ASCENZA AGRO S.A., Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA, Parque das Nações, 1990-207, Lisboa, Πορτογαλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ELTON®

Κεντρικά: Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), 190 11 Αυλώνας Αττικής
Τηλ.: +30 22950 29350-4, Fax: +30 22950 29305
Υπ/μα Βορείου Ελλάδος: ΒΙΠΕΘ. Ο.Τ. 42, Δ.Α.11, Τ.Θ. 174, 570 22 Σίνδος Θεσ/κης, Τηλ.: +30 2310 788002-3, Fax: +30 2310 799840

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 400 κ.εκ.

Καλλιέργειες – Ασθένειες – Δόσεις (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού) - Χρόνος εφαρμογής: Μηλιά, Αχλαδιά: Δόση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για ***Δίδιο*** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωμα των οφθαλμών έως ότου οι καρποί αποκτήσουν μέγεθος 10 mm περίπου (BBCH 01-71). **Ροδακινιά, Βερικοκιά:** Δόση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Για ***Δίδιο*** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από το φούσκωμα των οφθαλμών έως την αρχή χρωματισμού των καρπών (BBCH 01-71). **Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες):** Δόση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για ***Δίδιο*** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα 3 φύλλα μέχρι οι περισσότερες ράγες στο τσαμπί να εφάπτονται μεταξύ τους (BBCH 13-79). **Τομάτα (Θ):** Δόση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για ***Δίδιο*** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από την αρχή της άνθησης μέχρι το 10% των καρπών να αποκτήσει το τυπικό χρώμα ωρίμανσης (BBCH 61-81). **Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) (Υ, Θ):** Δόση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για ***Δίδιο*** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79). **Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Αγγουράκι) (gherkin) (Υ, Θ):** Δόση 30-35 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για ***Δίδιο*** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79). **Κολοκυνθοειδή με μη εδώδιμο φλοιό (Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα) (Υ, Θ):** Δόση 30-40 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για ***Δίδιο*** εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες από τα τέσσερα φύλλα της καλλιέργειας μέχρι 9 ή περισσότεροι καρποί στο κεντρικό στέλεχος να έχουν αποκτήσει το τυπικό μέγεθος και σχήμα (BBCH 14-79). **Παρατηρήσεις:** Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), Τομάτα (Θ), Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) (Θ), Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Αγγουράκι) (gherkin) (Θ), Κολοκυνθοειδή με μη εδώδιμο φλοιό (Καρπούζι, Πεπόνι, Κολοκύθα) (Υ, Θ): 3/7-14 ημέρες. Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκυθάκι) (Υ): 2/10 ημέρες. Κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό (Αγγουράκι) (gherkin) (Υ): 2/7-14 ημέρες. • **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμός φυλλώματος. • **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. • **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και ξεπλύνετε το τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. • **Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή του με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης, κατά προτίμηση, επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs. • **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. • **Φυτοτοξικότητα:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσεως. • **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): 14 ημέρες. Τομάτα (Θ), Αγγούρι-Αγγουράκι (gherkin)-Κολοκυθάκι-Πεπόνι-Καρπούζι-Κολοκύθα (Υ, Θ): 3 ημέρες.

Font: PF DIN
size: 7pt

Διάσταση εικονογράμματος 16x16mm