

ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

Συμπυκνωμένο Ενωτήριο (SC)

Υγρό λίπασμα ουρίας εμπλουτισμένο με θείο, βόριο και μολυβδαινίο, με χαμηλό ποσοστό διουρίας*, κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές και ριζοπότισμα.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

% Β/Β

Άζωτο ολικό (N): 15%

Άζωτο ουρικό (N-NH₂): 15%

Στοιχειακό θείο (S): 15%

Τριοξείδιο του θείου, SO₂: 37,5%

Βόριο (B): 0,5%

Μολυβδαινίο (Mo): 0,1%

*Διουρία: ≤0,25%

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH: 5,5-6,5 (εναώρημα 10%) • Ειδικό βάρος (Kg/L): 1,2

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

Φιάλες πολυαιθυλενίου 1L, με καθαρό βάρος 1,2Kg ± 2%.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος, σε θερμοκρασίες μεταξύ 4°C και 30°C, για να διατηρηθεί σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 (24 ώρες).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εγγυώμαστε τη σύνθεση, τις ιδιότητες και την ποιότητα του προϊόντος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχο μας, όπως η προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευασίας ή της ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβείτε τις συνιστώμενες δόσεις. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

SUPERB UREA

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ΑΖΩΤΟΥ - ΘΕΙΟΥ - ΒΟΡΙΟΥ - ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ
15 N + 15 S (37,5 SO₂) + 0,5 B + 0,1 Mo



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Παρασκευαστής:
AZUFERRA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA), Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120, Constantí (Tarragona), Ισπανία.



Διανομή - Διάρθρωση στην ελληνική αγορά:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

Χώρα παραγωγής: Ισπανία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υγρό λίπασμα ουρίας, θείου, βορίου και μολυβδαινίου, με χαμηλό ποσοστό διουρίας, κατάλληλο τόσο για διαφυλλικές εφαρμογές όσο και για ριζοπότισμα. Λόγω της υψηλής του περιεκτικότητας σε άζωτο, το SUPERB UREA συσπίνεται να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιόδους υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του φυτού. Το SUPERB UREA περιέχει άζωτο σε ταχίστα αφορώσιμη, ασφαλή και αποτελεσματική μορφή, για χρήση είτε διαφυλλικά είτε με ριζοπότισμα.

SUPERB UREA: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή περιεκτικότητα σε κύρια θρεπτικά συστατικά (ουρικό άζωτο και στοιχειακό θείο), προάγοντας έτσι μεγαλύτερη ανάπτυξη και αύξηση των φυτών και των καρπών.
- Μείωση των απωλειών αζώτου λόγω εξάτμισης, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση της εφαρμοζόμενης δόσης αζώτου.
- Υψηλής ποιότητας άζωτο, χάρις στο ουρικό άζωτο.
- Χαμηλότερο κόστος ανά στρέμμα σε σύγκριση με προϊόντα που περιέχουν μη αμμωνιακό άζωτο και θειικά άλατα.
- Ο ιδανικός συνδυασμός αζώτου, θείου, βορίου και μολυβδαινίου (N+S+B+Mo) το καθιστά ιδανικό τόσο για προανθικές όσο και μετασυλλεκτικές (π.χ. σπυροφόρα δένδρα) εφαρμογές.
- Όταν εφαρμόζεται με ριζοπότισμα, δρα ρυθμιστικά στο pH του εδάφους.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ:

Ελιά: 750-1.000 κ.εκ./ στρέμμα.

Εσπεριδοειδή, Οπωροφόρα: 350-500 κ.εκ./ στρέμμα.

Κηπευτικά, Λαχανικά: 250-400 κ.εκ./ στρέμμα.

Σιτηρά (Αρβόσπιτος, Κριθάρι, Σιτάρι, Ρύζι, κ.ά.): 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

Βιομηχανικά φυτά/ Ελαιούχοι σπόροι (Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Ηλίανθος, Τεύτλα, κ.ά.): 400-600 κ.εκ./ στρέμμα.

Γκαζόν: 175-325 κ.εκ./ στρέμμα.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ:

0,25-3 κ.εκ./ L (ανάλογα το στάδιο).

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ:

250 - 500 κ.εκ./ στρέμμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα προϊόντα θρέψης και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με εξαίρεση στα πολύ αλκαλικά προϊόντα και τα παραφινικά έλαια. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συστήνεται η διενέργεια δοκιμής μικρής κλίμακας πριν την εφαρμογή. Στην περίπτωση διαφυλλικής εφαρμογής του προϊόντος, δεν θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή παραφινικών ελαίων, 21 ημέρες πριν και μετά την εφαρμογή του SUPERB UREA.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)

