

**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροάζεται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλάσματος και αποβάλλεται και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

**ΘΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΛΙΑ** (ελαιοποιήσιμη και επιτραπέζια) (άνω των 3 ετών): Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα2 ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός την άνοιξη και το φθινόπωρο με δόση 400 – 600 κ.ε./ στρ. Για πολυετή ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός στην βάση του κορμού και για εξάλειψη των παραφυάδων σε παραφυάδες μικρότερες από 25 εκ. την Άνοιξη ή το Φθινόπωρο με δόση 600 κ.ε./ στρ. **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ:** Γκρέιφ φρουτ, Λεμόνι, Μανταρίνι, Πορτοκαλιά, Φράπια, Κιτρολέμονο, Περγανόνα, Κουμπκούτ, Νεραντζιά (άνω των 3 ετών): Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα2 ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι) με δόση 400 – 600 κ.ε./ στρ. Για πολυετή ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι) 600 κ.ε./ στρ. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ:** Αχλαδιά, Αχλαδομυλιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσουρούλια (άνω των 3 ετών): Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα2 ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι) με δόση 400 – 600 κ.ε./ στρ. Για πολυετή ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι) 600 κ.ε./ στρ. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Βερνικιά, Βυσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά (άνω των 3 ετών): Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα2 ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι ή Άνοιξη-φθινόπωρο) με δόση 400 – 600 κ.ε./ στρ. Για πολυετή ζιζάνια κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι ή Άνοιξη-φθινόπωρο) 600 κ.ε./ στρ. **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρη / στρέμμα:** ΕΛΙΑ: Για ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα2 ζιζάνια 20 – 50 , για πολυετή ζιζάνια για εξάλειψη των παραφυάδων 20, **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ:** 20-50, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** 30 - 50.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μεταυλικά κτενείς:** ΕΛΙΑ: 60 ημέρες, **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ / ΜΗΛΟΕΙΔΗ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Δεν ορίζεται.

**Φυτοτοξικότητα:** Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες όπως αμύγδα, άλλα οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά, μηδική κ.α., γι' αυτό αποφεύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος. Στην περίπτωση γειτνίασης με καλλιέργειες μηδικής, πραγματοποιήστε την εφαρμογή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη σπορά της καλλιέργειας αυτής.

**Μείγνιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστημα εφαρμογών:** ΕΛΙΑ, Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: 1 – 2 / 90 ημέρες | Ελιά (Εξάλειψη των παραφυάδων) 1.

**Παρατηρήσεις:** 1) Εφαρμόζεται σε ήδη φυτωρμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών). 2) Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφευχθούν οργάνωματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 1. Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια: Βρόμοι (*Bromus* sp.), Αιματόχορτο (*Digitalis sanguinalis*), Μουχρίτσο (*Echinochloa crus-galli*), *Lolium* spp., *Poa annua*, *Setaria* (*Setaria* sp.), 2. Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (*Amaranthus retroflexus*), *Καρμύλα* (*Capsella bursa-pastoris*), Καρδαμύνη (*Cardamine hirsuta*), Κόνινα (*Conyza* sp.), Περικονιάδα (*Convolvulus arvensis*), Άγρια ρόκα (*Dipsacis erucoides*), *Erigeron* sp., Μολόχα (*Molva sylvestris*), Μηδική (*Medicago* sp.), Ρανούνκουλος (*Ranunculus repens*), Μαρτάκος (*Senecio vulgaris*), Ήμερο ανάπι (*Sinapis alba*), Ζυχοί (*Sonchus oleraceus*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Βερνίκια (*Veronica* sp.), 3. Πολυετή ζιζάνια: Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Αλογοουρά (*Equisetum* sp.), Μέντα (*Mentha* sp.), Οξαλίδα (*Oxalis pes-caprae*), Πένταγυρο (*Plantago* spp.), Ταρσάκος (*Taraxacum officinale*), Αγριοτριφύλλο (*Trifolium repens*), Μετρίνα ευαίσθητα ζιζάνια: Ζυχοί (*Sonchus asper*), Αγριοτριφύλλο (*Trifolium arvense*).

**Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλείται:** Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία glyphosate η οποία ανήκει στην ομάδα 9 κατά HRAC και την δραστική MCPA η οποία ανήκει στην ομάδα 4 κατά HRAC. 1. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επιθυμητές πληγές κλοδέματος. 2. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκατεστημένους οπωρώνες από το 3ο έτος από την φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 3. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή σε 6 ώρες. 4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 5. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητική μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης προστατευόμενης καλλιέργειας/ καλλιεργειών που ακολουθούν:** Δεν εφαρμόζεται.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

# ΥΛΑΜΒΟ

Glyphosate + MCPA

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

Glyphosate 18% (24,29% B/o υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης)

+ MCPA 18% (23,3% B/o υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης)

Βοηθητικές ουσίες: 56,4 % [B/B]

Διασυστηματικό  
ζιζανιοκτόνο  
για την καταπολέμηση  
ετήσιων  
και πολυετών  
(αγρωστωδών  
και πλατύφυλλων)  
ζιζανίων

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ  
ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ  
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
1 ΛΙΤΡΟ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70422/21.05.2021

Παρασκευαστής σκευάσματος, κάτοχος της άδειας:

LAINCO S.A. Pol. Ind. Can Jordi Avda. Bizet, 8-12 08191 Rubi, Barcelona, Ισπανία



Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά – Εργαστήριο συσκευασίας – Διανομή:

**ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής  
Τηλ.: 210 5550431 • Email: ellagret@ellagret.gr  
www.ellagret.gr

## ΠΡΟΣΟΧΗ

• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.



**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποκαμεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο χώρο της έκθεσης. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιδοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια σκέπαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: **ΕΣΠΕΡΙΔΕΙΔΗ:** 20 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 10 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, **ΜΗΛΟΕΙΔΗ / ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ/ΑΚΡΟΔΡΥΑ:** 25 μέτρα αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15 μέτρα με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, **ΕΛΙΑ:** 12 μέτρα εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης. Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης στην μελιτζάνα θερμοκηπίου πιερίδα θερμοκηπίου, αγγούρι θερμοκηπίου, τομάτα θερμοκηπίου, καλύψτε τις κυψέλες κατά την διάρκεια της εφαρμογής και για 48 ώρες μετά. Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση. Αερίστε τα θερμοκήπια στα οποία έγινε η εφαρμογή, μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά, πριν τη επανεξόδο.

Περιέχει 2-ethylhexyl-S-lactate. Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**Τρόπος εφαρμογής:** Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγή των συσσωρεύσεων υπολειμμάτων τους καρπούς. Χρησιμοποιείτε μικρό τύπου σκόπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Αναμίξτε καλά τη ψυλή πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστικού:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορραπάνετε και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Συνδυαστικότητα:** Δε συνιστάται η ανάμειξη με άλλα σκευάσματα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλή ξεπλύση (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριπλή, για τη διασφάλιση τους μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)

