

OSTRIA® 45 EW

2,4-D οξύ 45 % β/ο
υπό μορφή 2,4-D 2-αιθυλο έξυλο εστέρα
(ΕΗΕ): 67,84% β/ο

Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν θα πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αιμάσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άρθρονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Εάν παρατηρήθει ερεθισμός του δέρματος ή ευφραντίστε εξάνθημα: Συμβουλεύετε /Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια αιμάσως με άρθρον νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβούλη. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **Πληροφορίες για τον γιατρό:** Συνιστάται πλήρης στομάχου με επανειλημμένη χορήγηση διαλυμάτων ενεργού ανθράκα και συνεχή παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας. Για την καρδιακή αρρυθμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί θεική κουινιδίνη (quinidine sulphate). Προσοχή στη χορήγηση και στη δόσης οικειωσμάτων αδρεναλίνης. Δεδομένου ότι οπαύβλετα δια μέσου των νεφρών, συνιστάται η διάλυσή του καθώς και ελεγχός της ισορροπίας νερού και ηλεκτρολογίων. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210-77.93.777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.

Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των φυκασμένων ζιζανίων.

Τρόπος δράσης: Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων. Μετακινείται διασυστηματικά στους φυτικούς ιστούς δια μέσου τόσο του συμπλάστη όσο και του αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς. Προκαλεί επιναστία και ασύμπτωτη αύξηση των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή των φύλλων και των νεαρών βλαστών τους και επηρεάζει την αναπνοή, τα αποθέματα των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, και την κυτταρική διάρεση. Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρά όπως και οι φυσικές αυξίες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φίλαδες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάληγο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο φυκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περιατέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο έξρο, δροσερό και καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από τη ζέστη, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-25°C) και όχι κάτω από 0 °C.

23006/1214/GR

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι Κριθάρι, Βρώμη, Σικαλή	Πλαταύφυλλα ζιζάνια*	75-80 κ.εκ. σκ./στρ.	Στάδιο της καλλιέργειας: Από το τέλος του αδελφώματος μέχρι την αρχή του καλαμώματος (πρώτο κόμβο).

*Ευαίσθητα ζιζάνια: Άγριο σινάπι, Αναγαλλίδα, Λουρουδιά, Ρανούγκουλας, Ραπανίδα. Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια: Κίρσιο, Παπαρούνα, Πολυκόμπιτ, Περιπλοκάδα.

Παρατηρήσεις: 1. Τα επήσια ζιζάνια φεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη. 2. Τα πολευτεί ζιζάνια φεκάζονται από το μπουμπούκιασμα μέχρι λίγο πριν από την άνθηση. 3. Για τον καλύτερο έλεγχο του κίρσιου (*Cirsium arvense*) η εφαρμογή πρέπει να καθυστερήσει μέχρι αυτό να αποκτήσει 15 – 20 εύφορο. 4. Οι μεγαλύτερες δόσεις και οι μεγαλύτερος όγκος φεκαστικού υγρού συνιστάται όταν τα ζιζάνια είναι μεγαλύτερα ή και σε μεγαλύτερη πυκνότητα. 5. Μην φεκάζετε πριν το άδελφωμα ή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους. 6. Μην φεκάζετε όταν φυσάει 7. Να μην εφαρμόζεται σε ευαίσθητες περιοχές στις οποίες υπάρχουν αμμώδη εδάφη και υψηλά επίπεδα βρωχόπτωσης.

Όγκος φεκαστικού υγρού: 25-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες): Χειμερινά σιτηρά:-

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος μεταφυτωτικός φεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 25-30 λίτρα νερό ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μετεκ τύπου σκούπας και φεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής του φεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του φεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε σκληρό ή ακάθαρτο νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Καθαρισμός φεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το φεκαστικό ύγιος. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του φεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άρθρον νερό. **Αντιμετώπιση ανθεκτικότητας:** Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο 2,4-D.

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση:
2,4-D οξύ: 45 % β/ο
(υπό μορφή 2,4-D 2-αιθυλο έξυλο εστέρα
(ΕΗΕ): 67,84% β/ο)
Βοηθητικές ουδείς: 34,04 % β/β

ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΕΥΑΛΚΑΝΟΪΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ (ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΒΡΩΜΗ)

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Αδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70103/18-11-2014

Κάτοχος της άδειας:
Greenfarm Χημικά Α.Ε.
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή,
Τηλ.: 210 6990932, fax: 2106990862, e-mail: info@gr.nufarm.com

ΔΙΑΝΟΜΗ: ΕΠΠΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θεσσαλονίκη, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 55 55 220, 55 59 001-2
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ' ΦΑΣΗ ΒΙ.Π.Ε.Θ. - Σινδος
Τηλ: 2310 79 58 84

Περιεχόμενο:
800 κ.εκ. €



Προσοχή

