

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / εκνεφώματα. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν χρειασθεί, να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε γιατρό αμέσως. Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραιώση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω ανημετώπιση. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** πενικιλαμίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά.

Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών

από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 5) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γρ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Μηλοειδή, Αμπέλι, Λαχανικά, Ζαχαρότευτλα: 3. Φιστικιά, Πυρηνόκαρπα: 4. Εσπεριδοειδή, Ελιά, Τομάτα (Υ+Θ), Πατάτα, Καλλυπτιστικά: 2. **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:**

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας



CouRE FLOW 38 SC

Copper oxychloride (Οξυχλωριούχος χαλκός) Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός 38% β/ο
(σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 53,20% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 800 κ.εκ.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60731/11.12.2018

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής του σκευάσματος - Εργοστάσιο παρασκευής:

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.,

Av. de Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, Spain

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ANOPTKAXHM AE, Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή :

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100

www.ellagret.gr

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΟΣΕΙΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κίτρινα, Νερατζιά): για **Κυτάρια καρπών** με εφαρμογή το δεύτερο 15νήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3 - 4 μήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος. Δόση: 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (315-500 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **Αμυγδαλιά:** για **Κηλίδωση φύλλων**. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μύα. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (210-315 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΚΑΡΥΔΙΑ:** για **Ανθράκωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών** με εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (210-315 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΦΙΣΤΙΚΙΑ:** για **Στεπτιώση** με εφαρμογές α) Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης β) όταν ο καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ. γ) μετά από 20 ημέρες δ) αρχές φθινοπώρου μετά τη συγκομιδή των καρπών. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (210-252 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΦΥΝΤΟΥΚΙΑ:** για **Βακτηριακό έλκος**. Στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α) μόλις αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα και β) όταν πέσει το 75% των φύλλων. Δόση: 210 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (210-315 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): για **Φουζικλάδιο, Στεπτιώση, Φαιά σήψη** με εφαρμογές το φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών, για **Βακτηρίωση, Βακτηριακό κάψιμο** στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προσβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση: 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. (325 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά): για **Κορύνε, Εξίσασκο, Κλαδοσπορίωση** στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν τη διάγκωση των οφθαλμών, για **Φαιά σήψη** με εφαρμογές στη διάγκωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή, για **Βακτηριακό έλκος** στις περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων. Δόση: 220 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (220-260 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΑΜΠΕΛΙ** (για επιτραπέζια και οινοπαραγωγή σταφύλια): για **Περωνόσπορο, Ανθράκωση** με εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόση: 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (170-340 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΕΛΙΑ:** για **Κυκλοκόνιο** δύο εφαρμογές: η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ., για **Γλοισπόριο** δύο εφαρμογές: η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα, για **Καρκίνωση** με εφαρμογές μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. Δόση: 340 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. (510 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Καρότο, Ραπανά, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Αγκινάρα, Σέλινο, Φασόλι, Μπίζελ): για **Περωνόσπορο** με εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες, για **Ανθράκωση, Στεπτιώση, Κλαδοσπορίωση** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (155-310 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΤΟΜΑΤΑ** (Υ+Θ): για **Περωνόσπορο** με προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, για **Βακτηριακή κηλίδωση** με εφαρμογές που γίνονται με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση της. Δόση: 325 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (165-325 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΠΑΤΑΤΑ:** για **Περωνόσπορο** με εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατ. και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 310 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. (155-310 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ:** για **Κερκοσπορίωση** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 450 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό (180 κ.εκ. σκευασμ./ στρ.). **ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ:** για **Περωνόσπορο, Φυτόφθορα** με εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόση: 370-450 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. (185-450 κ.εκ. σκευασμ./στρ.).

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: (λίτρα/στρ.): Εσπεριδοειδή 125-200, Αμυγδαλιά / Καρυδιά / Φουντουκιά 100-150, Φιστικιά 100-120, Μηλοειδή 100, Πυρηνόκαρπα 100-120, Αμπέλι 50-100, Ελιά 150, Λαχανικά / Τομάτα (υ+θ) / Πατάτα / Καλλυπτιστικά 50-100, Ζαχαρότευτλα 40. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):** Εσπεριδοειδή, Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοπαραγωγή σταφύλια), Ελιά, Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Φουντουκιά: 28, Τομάτα (υπαίθρου): 10, Τομάτα (θερμοκηπίου), Λαχανικά (υ+θ): 7, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή).

Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντάς το και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.