

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών, το Cyproconazole μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το Azoxystrobin μυκητοκτόνο με αντισπορογόνο δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και από το φύλλωμα των καλλιεργειών και αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και της παραγωγής σπορίων καθώς και την αναστολή ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις (κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα) - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Σιτάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε: Δόση 80-100 κ.εκ. Όγκος ψεκαστικού υγρού 10-40 λίτρα / στρέμμα. Για Στεπτορίωση εφαρμογές προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Η 1η εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου κόμβου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του φύλλου σημαία και η 2η εφαρμογή πριν την αρχή της άνθησης.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστημα (ημέρες): 2/21

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Τηρείτε το μέγιστο αριθμό εφαρμογών (2) ανά καλλιεργητική περίοδο. Αποφεύγετε τις συνεχόμενες εφαρμογές του σκευάσματος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Να γίνεται εναλλαγή ψεκασμών με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε καλά την φιάλη και προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστικό υγρό αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Συνδυαστικότητα: --

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σιτάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε: 42 ημέρες

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

COMRADE SC

Azoxystrobin (Αζοξιστραμπίν) +
Cyproconazole (Συπροκοναζόλ)

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: Azoxystrobin: 20% β/ο
Cyproconazole: 8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 73.9% β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο μίγμα δυο δραστικών συστατικών, το Cyproconazole μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το Azoxystrobin μυκητοκτόνο με αντισπορογόνο δράση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

• **Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.** • **Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει 5-chlorine-2-methyl-2H-isotiazol-3-one.** • **Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.** • **Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.** • **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 800 κ.εκ.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60488/21.12.2015

Κάτοχος της άδειας: SHARDA EUROPE B.V.B.A Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SHARDA BALKAN
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Παύλου Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι



Διανομή: **ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ**

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ΄ Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων / εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια, φόρμα και μπότες και κατά την εφαρμογή».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. **Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν χρησιμοποιώντας με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης – Χρονική σταθερότητα: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό (σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 °C και 30°C) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

