

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Βόριο (B), υδατοδιαλυτό 11% B/B

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

pH: 8,5 +/- 0,5
πυκνότητα: 1,35g/ml

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια,
με το δέρμα ή με τα ρούχα. Πλυνθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 (24 ώρες).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό μακριά από ήλιο και ζέστη και δροσερό και θερμοκρασίες μεταξύ -7°C και 25°C, για να διατηρηθεί σταθερό.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί είτε από την χρήση, την αποθήκευση και την χρήση του προϊόντος, όπως οι συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω σύμφωνα με τον έλεγχο του παρασκευαστή. Ο χρήστης αναλαμβάνει όλα τα ρίσκα της αποθήκευσης, χρήσης και εφαρμογής του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλώ να διαβάστε προσεκτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την εθνική νομοθεσία.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.



Προϊόν πιστοποιημένο
σύμφωνα με τον κανονισμό λιπασμάτων
της ΕΕ Καν. (ΕΕ) 2019/1009



Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος
κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά -
Εργαστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431
email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

ELLABOR

ΚΛΠ I(C) (II) (a)
ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ELLABOR** είναι σταθερό διάλυμα λιπάσματος Βορίου βασισμένο σε ένα μη ιονισμένο μοριακό σύμπλοκο Βορίου αιθανολαμίνης, έτσι ώστε το στοιχείο του Βορίου να απορροφάται διασυστηματικά και να αποδεσμεύεται διαμέσου της ροής των φυτικών χυμών. Το σύμπλοκο Βορίου προάγει τη μεταφορά σακχάρων στους νεαρούς βλαστούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εφαρμογή του προϊόντος, ευνοεί τη γονιμοποίηση και την καρπόδεση και προάγει τη βλάστηση μέσω της μεταφοράς θεμελιωδών μονάδων για τη βιοσύνθεση σακχάρων στους νεαρούς βλαστούς.

Να γίνεται χρήση σε περίπτωση εμφάνισης ανάγκης. Μην ξεπερνάτε την συνιστώμενη δόση

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Στα εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, αμπέλι και ελιά: Εφαρμόζεται:

Διαφυλλικά με δόση 150-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό σε 3 εφαρμογές με αρχή πριν την άνθηση μέχρι και το γέμισμα των καρπών

Κηπευτικά: δόση 100-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό σε 3 εφαρμογές ξεκινώντας από την βλαστική ανάπτυξη και επαναλαμβάνεται κάθε 10-14 ημέρες

Ηλιανθος: δόση 100-200 κ.εκ./100 λτ νερό. 1-2 εφαρμογές από το στάδιο των 4 φύλλων έως την εμφάνιση των άνθεων

Ελαιοκράμβη: 150-300 κ.εκ./100 λτ νερό. 2 εφαρμογές κατά την κυτταρική επιμήκυνση έως πριν την άνθηση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Να προηγείται δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρή ποσότητα πριν την εφαρμογή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No) }

