

### Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις σκευάσματος-

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής-Μεγ. αριθμός εφαρμογών/καλλ/κη περίοδο:

**Αραβόσπορος:** Για ζιζάνια με 0,75 κ.ε./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max) ή 112,5-150 κ.ε. σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με ψεκάσιμο φυλλώματος (BB CH 12-18).

**Ευαίσθητα ζιζάνια:** Βλήθα (*Amaranthus* sp.), Σκαρολάχανο (*Mercurialis annua*), Μουρίτσια (*Echinochloa crus-galli*), Αιμπόχορτο (*Digitaria* spp.), Σετάρια (*Setaria* spp.), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*).

**Μερίκιες ευαίσθητα ζιζάνια:** Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Αγριοματάι (*Solanum nigrum*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Πολύγωνο (*Polygonum conocephalum*), Πάνικο (*Panicum italicum*).

\* Για την καταπολέμηση των εν λόγω ζιζανίων να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διακριτική ανθεκτικότητα:** Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και i) σποράς ή φύπησης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το TALISMAN, στον ίδιο αγρό, και κατά την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσπορος. ii) σποράς ή φύπησης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Για σπορά χειμερινού σπαριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες και οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια στην επόμενη άνοιξη (1 έτος μετά) από την εφαρμογή του TALISMAN και αφού προηγηθεί βαθιά άρση. iii) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Επιτρέπεται η είσοδος εργατών στον αγρό αφού έχει στεγνώσει το ψεκάστικο υγρό πάνω στα φυτά. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων για βόσκηψη για 50 ημέρες μετά τον ψεκάσιμο.

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσιμο φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκάστικού υγρού:** Γαμίστε το δοχείο του ψεκάστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκάστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκάστικών:** Ξεπλύνετε καλά τα ψεκάστικά μέσα μετά τον ψεκάσιμο για να μην προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια το ψεκάστικό μέσο. Συνιστάται η χρήση αμμωνιακού διαλύματος 3%. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κλωρίνη οικιακής χρήσης.

**Να ακολουθηθούν τα εξής στάδια καθαρισμού:** 1) Αδειάστε τελείως το βυτίο. Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκάστικού (αντλία, ψεκάστικό αυλό). Αδειάστε τελείως το βυτίο. 2) Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό στο οποίο προσθέστε μισό λίτρο αμμωνιακής οικιακής χρήσης 3% ανά 100 λίτρο. Κυκλοφορήστε το διάλυμα αυτό μέσω όλου του συστήματος για 10 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως το βυτίο ξανά. 3) Ξαναγεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό και κάντε το να περάσει μέσα από όλα τα μέρη του ψεκάστικού (αντλία, ψεκάστικό αυλό). Αδειάστε τελείως το βυτίο.

# TALISMAN

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)



Ζιζανιοκτόνο

### Εγγυημένη σύνθεση:

**Δραστική ουσία:** — Nicosulfuron 4% (β/ο)

**Βοηθητικές ουσίες:** — 96% (β/β)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 70212/06.06.2017

**Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβόσπορου. Το nicosulfuron δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξυγαλακτικού.**

### ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΕΡΙΣΣΟΜΕΝΟ  
1 λίτρο



**GALENIKA - FITOFARMACIJA**

● Προξενεί ερεθισμό του δέρματος. ● Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. ● Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. ● Εάν ζητήσετε κατηκή συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ● Φυλάσσετε κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. ● Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. ● Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κάτοχος της άδειας:

Galenika-Fitofarmacija d.o.o  
Brezovica pri Ljubljani, Σλοβενία

Παρασκευαστής σκευάσματος:

Galenika Fitofarmacija a.d., Belgrade, Σερβία

**Πρώτες βοήθειες -Αντιδοτο:** ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. ● Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. ● Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

● Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμά ή τη συσκευασία του.

● Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. Δεν απαιτείται ανέκαστη ζώνη προστασίας με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς κατά 75%.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα: —**

**Φυτοτοξικότητα:** Κατά την 1<sup>η</sup>-2<sup>η</sup> εβδομάδα μετά την εφαρμογή είναι δυνατόν να παρατηρηθούν κλωρώσεις στα φύλλα του καλαμποκιού. Το φαινόμενο αυτό είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης δόσης, είναι δε παροδικό. Δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή της αποδόσεως.

-Να μη χρησιμοποιείται στο 'γλυκό καλαμάκι' και σε καλλιέργειες σε αραβόσπορο που προορίζεται για σπορά.

**Χρονικά επέμβαστα πριν τη συγκομιδή:** Αραβόσπορος -

**Τελική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης:** Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-30 °C.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΑΗΞ.: βλέπε επί της συσκευασίας

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες

H FARMACHEM SA  
εργοστάσιο παρασκευής  
Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας  
**ISO 9001**

Μέλος της  
**ECCA**  
European crop care association



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

**FARMA-CHEM SA**

ΔΙΕΥΘ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: ΒΙ.Π.Ε. Γ. Γ. ΖΩΝΗ

ΤΗΛ.: 2310 569 630 έως 33 - FAX: 2310 797 047

T.Θ. 1026 ΒΙ.Π.Ε. - Τ.Κ. 570 22 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**FARMA - CHEM SA**

www.farmachem.gr, e-mail: info@farmachem.gr