

Δηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένα. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικό ενδύματα/ μέσα αποικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Φοράτε προστατευτικά ενδύματα/ μέσα αποικής προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και προστατευτικά ενδύματα κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επαναεσοδού μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρό παντελόνι. Διάθεση περιεχομένου/ περίεκτη σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία. Μην ρυτινείτε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήνετε μίαν φυτική ζώνη ανάασης, **10 μέτρων** από επιφανειακά νερά, σε χειμερινά σιτηρά. Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήνετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη, **10 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.μ.υ. κατά 50% ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψ.μ.υ. κατά 75%. Δεν απαιτείται απέκαστη ζώνη προστασίας όταν ψεκάσετε με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψ.μ.υ. κατά 90%.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΞΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΛΗΦΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΤΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΠΤΗΣ με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΘΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7377277**

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοικών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Χειμερινά και Ανοξείατα σιτηρά. Απορροφείται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μερισματικούς ιστούς όπου αναπτύσσεται το κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επινασία και ασύμμετη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής
		κ.κ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)	
Χειμερινά σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη)	Πλατύ-φυλλα ζιζάνια	100	20-40	Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση του πρώτου κούβου (αρχή καλιμώματος) έως το στάδιο του φύλλου σημεία BBCH 31-39.
Ανοξείατα σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη)	Πλατύ-φυλλα ζιζάνια	100	20-40	Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του δεύτερου κούβου (αρχή καλιμώματος) BBCH 13-32.

VERITY 750 SL

Πυκνό διάλυμα (SL)

MCPA 75% (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης)

Εγγυημένη σύνθεση: MCPA οξύ 75% β/ο (υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης 91,85 % β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 20,6 % β/β

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοικών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Χειμερινά και Ανοξείατα σιτηρά.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 450κ.εκ.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70377/28.01.2020

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Alalay Business Center, Carril Condominia nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Εργαστάσιο συσκευασίας - Διανομή:



ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Εμπροσθαίου, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Μέγιστος εφιαρμόσιμος ζιζάνια κατάλληλη περίοδος: μία (1).

Παρατηρήσεις: 2. Για ζιζάνια ψεκάζονται σε νερό στάδιο ύψους 20 – 30 εκ. ύψους ενώ βροχοποιείται σε γρήγορη ανάπληξη. 2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 3. Μην ψεκάσετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή. 4. Μην ψεκάσετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10°C ή μεγαλύτερη από 25°C. 5. Μην ψεκάσετε όταν επικρατούν συνθήκες καπνότητας των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ήραση, νεοκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημίες κ.α.

Καταπολέμηση ζιζανίων: Ευσάθητα ζιζάνια: Αναγallis (Anagallis arvensis), Καυέλλα (Capsella bursa-pastoris), Κεντούρι (Centaurea cyamus), Λουβουράκι (Chenopodium album), Περίκοκκος (Convolvulus arvensis), Κολιτσίδα μεγαλόκροτη (Galium aparine), Γεράνι (Geranium dissectum), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Λάμο (Lamium spp.), Χυμοίλη (Matricaria spp.), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), Ρατανιά (Raphanus raphanistrum), Λάμπο (Rumex sp.), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Ζωχός (Sonchus arvensis), Σπέργυλα (Spergula arvensis), Στελλάριδα (Stellaria media), Βερώνια (Veronica sp.), Ριδολλία σεγατόμη.

Μετριας ευσάθητα ζιζάνια: Ανθεμίδια (Anthemis arvensis), Καρδουμίνια (Cardamine hirsute), Κεράστιο (Ceratium spp.), Κίρσο (Cirsium arvense), Πικρίς (Picris/Helminthotheca echinoides) Πολυκόμμη (Polygonum aviculare).

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφα μεταφυτρωτικά ψεκαστικά του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε μέτρο τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από δύο (2) ατμόσφαιρες (30 PSI).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Εμφίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μεν με νερό. Προσθέστε την συντακόμενη δόση συσκευασίας στο ψεκαστικό δοχείο αναδευόμενα. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό ανακυκλώνοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός μηχανημάτων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδεικτίστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείματα και ξεπλύνετε καλά τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάι με άφθονο καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φωτοσφαιρικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταρροθούν με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, να ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλίσθει: Διαχείριση Ανθεκτικότητας. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικές μέθοδοι κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται ενδελεχής ζιζανιοκτονία (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας είναι δυνατή η επανασπορά, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την άρση για μη καλλιεργηθούν ευαίσθητα φυτά όπως τομάτα, τεύτλα, βαμβάκι.

Χρονική διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου σε των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στο φυτό.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συντακόμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται. Καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ήπιο, όρσορο και καλά αερισμένο περιβάλλον σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερ. Παραγωγής: Βλέπε επί της συσκευασίας
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας