



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19-6-2015
Αριθ. πρωτ: 3507/41222

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο: 210 92 87 250

Προς: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Παραδεισου 2 & Κηφισίας
151 25, Μαρούσι
Dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ. 60305 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CABRIO DUO 4/7.2 EC (δ.ο. pyraclostrobin/dimethomorph) ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τις δηλώσεις προφύλαξης”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
4. Την αξιολόγηση της ισοδυναμίας από το ΚΜ Γερμανία (September 2014).
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 668/2013 της 12^{ης} Ιουλίου 2013 με τον οποίο τροποποιούνται τα παραρτήματα II και III του Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των 2,4-DB, dimethomorph, indoxacarb, and pyraclostrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
6. Τη με αριθ. Πρωτ. 229/3553/15.01.2015 (ΦΕΚ 75/Β/16.01.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

7. Την υπ' αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β'/02.3.2015) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ε. Αποστόλου.
8. Τις με αριθ. πρωτ. 2349/28462/11-3-2015 και 3507/41222/14-4-2015 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
9. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60305 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) CABRIO DUO 4/7.2 EC (δ.ο. pyraclostrobin/dimethomorph) η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 92315/19-1-2011 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τις δηλώσεις προφύλαξης. Συγκεκριμένα τα σημεία 1, 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Pyraclostrobin:

1) BASF Schwarzheide GmbH
Schipkauer Strasse 1
01986 Schwarzeide
Γερμανία

2) IPT Pergande GmbH
Wilfried-Pergande-Platz 1
06369 Weissandt-Goelzau
Γερμανία

Dimethomorph:

1) Servatis S.A., Βραζιλία
2) Jiangsu Huifeng Agrochemicals Co,
Ltd, Κίνα

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1) BASF SE, 67056 Ludwigshafen,
Γερμανία

2) BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.Π.Ε.
Σίνδου, Θεσσαλονίκη

3) K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσ/νίκη

4) BASF Agri-Production S.A.S.
Rue Jacquard
Z.I. Lyon Nord
69727 Genay Cedex - B.P. 73
Γαλλία

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκ./στρ	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρο ύ	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Κρεμμύδι (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικές ουσίας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σκόρδο (Υπαίθρου)	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	200-250	500	40-50	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου φύλλου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικές ουσίας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	200-250	250- 400*	50-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών στην αρχή της άνθησης.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται
-Αγγούρι -Κολοκύθι (Θερμοκηπίου)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	250	250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη σχηματισμού των καρπών.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται

Πεπόνι, Καπούζι (Υπαίθρου)	<i>Περονόσπορος</i> (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	250	-	80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μαρούλι (Υπαίθρου)	<i>Περονόσπορος</i> (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Λυκοτριβόλο (Υπαίθρου)	<i>Περονόσπορος</i> (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πατάτα	<i>Περονόσπορος</i> (<i>Phytophthora infestans</i>)	200-250	-	80-100	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν να κλείσουν οι γραμμές της καλλιέργειας.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες εφόσον απαιτείται

Παρατηρήσεις:

*Η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

- Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής.
- Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
- Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

Η χρήση στην καλλιέργεια Σκαρόλα (Υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Σκαρόλα (Υπαίθρου)	<i>Περονόσπορος</i> (<i>Bremia lactucae</i>)	200-250	-	40-80	Έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 5 ^{ου} πραγματικού φύλλου.	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-8 ημέρες εφόσον απαιτείται και τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 7 ημ.
-----------------------	---	---------	---	-------	---	---

Παρατηρήσεις:

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας

11 Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P261d: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
P280e: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ενδύματα.
P264: Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

«Η ανάμιξη φόρτωση του προϊόντος να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο»

«Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει»

«Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά την διάρκεια της εφαρμογής στο θερμοκήπιο»

SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Κρεμμύδι, Σκόρδο (Υπαίθρου)	7
Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου)	3
Αγγούρι, Κολοκύθι (Θερμοκηπίου)	1
Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου)	3
Μαρούλι, Λυκοτρίβολο (Υπαίθρου)	7

Πατάτα	3
--------	---

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. **60305** άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **CABRIO DUO 4/7.2 EC (δ.ο. pyraclostrobin/dimethomorph)** η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 92315/19-1-2011 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ