

PROXANIL DUO SC (Propamocarb 40%, Cymoxanil 5%)



Μυκητοκτόνο για τον έλεγχο του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) στην πατάτα και την τομάτα, με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση. Το **cymoxanil** έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων. Το **propamocarb hydrochloride** είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που παρεμποδίζει τη μυκηλιακή ανάπτυξη καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των σπορίων του μύκητα.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προφυλάξεις και τις οδηγίες χρήσης δίνονται στο εσωτερικό της ετικέτας

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Αριθ. Άδειας Διάθ. στην Αγορά: 60453/ 14.05.2015

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Propamocarb 40 % β/ο, Cymoxanil 5% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 55,7% β/β

SC - Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl,
Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
UPL Ελλάς Α.Ε., Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 15233,
Τηλ.: 210 5578777

Αριθ. Παρτίδας (Batch No)/Ημερ. Παραγωγής (MFG Date):
Βλέπε συσκευασία



Εργαστήριο συσκευασίας -
Διανομή:
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο,
19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431
Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ


Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Περιεχόμενο: **100 ml**



SIDE A'



PROXANIL DUO SC (Propamocarb 40%, Cymoxanil 5%)

Μικητοκτόνο για τον έλεγχο του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) στην πατάτα και την τομάτα, με προστατευτική, θεραπευτική και αντιπαροχνογόνα δράση. Το **cymoxanil έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Είναι τοπικά διασυστηματικό μικητοκτόνο και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σποριών. Το **propamocarb hydrochloride** είναι διασυστηματικό μικητοκτόνο που παρεμποδίζει τη μυκηλιακή ανάπτυξη καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των σποριών του μύκητα.**

Αριθ. Άδειας Διάθ. στην Αγορά: 60453/ 14.05.2015

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Propamocarb 40 % β/ο, Cymoxanil 5% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 55,7% β/β

SC - Συμπυκνωμένο εναιώρημα

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl,
Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Belgium

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
UPL Ελλάς Α.Ε., Ριζαρέυο 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ.: 15233,
Τηλ.: 210 5578777

Αριθ. Παρτίδας (Batch No)/Ημερ. Παραγωγής (MFG Date):
Βλέπε συσκευασία

Περιεχόμενο: **100 ml**



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). **Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πνιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 10 - 15 λεπτά τουλάχιστον. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα. Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφιρτέ τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε διαταραχές αναπνευστικού χορηγήστε οξυγόνο. Σε περίπτωση ακανόνιστης αναπνοής ή διακοπή αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αναζητείτε ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό και μη δώσετε υγρά. Μη χορηγήτε τίποτα σε ανίσθητο άτομο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία και συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων. **Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.


Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη. Αποφύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά ενδύματα και προστατευτικά γάντια.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

SIDE B'



Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με νερό ως τη μέση. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: ---

Φυτοτοξικότητα: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται

σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική αραβαστία συσκευασίας του και σε μέρος ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων (ημέρες):

ΠΑΤΑΤΑ: Για **Περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*), με δόση: **250 κ.εκ./ στρέμμα** (max) και όγκο ψεκαστικού υγρού: **30-100 λίτρα/στρ.** Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια και το αργότερο με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 21-95). **Έως 6(6) εφαρμογές (μέγιστο) ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιαστήματα επεμβάσεων 7 ημέρες.**

TOMATA (Υγαιθρού & Θερμοκηπίου): Για **Περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*), με δόση: **250 - 400 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού** (max 250 κ.εκ./ στρέμμα) και όγκο ψεκαστικού υγρού: **60-100 λίτρα/στρ.** Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια και το αργότερο με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 21-89). **Έως τρεις (3) εφαρμογές (μέγιστο) ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιαστήματα επεμβάσεων 7 - 10 ημέρες.**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Πατάτα: **14 ημέρες**, Τομάτα: **3 ημέρες**.



Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση: Επρωτήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

