

Fluometuron
(φλουμετουρόν)

MANTIS

Εγγυημένη σύνθεση:
Fluometuron: 50% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 56.12% (β/β)

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

**Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων
ζιζανίων στο βαμβάκι**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**



ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποπτό για πρόκληση καρκίνου
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιεχόμενο: 5 Λίτρα

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70352/14-10-19



Κάτοχος της άδειας - Υπεύθυνος
για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr



Διανομή-Συσκευασία:

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Email: ellagret@ellagret.gr
www.ellagret.gr

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας υιοθετήστε εναλλακτικές πρακτικές αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικές), όπου είναι εφικτό ή κάνετε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό, μπορεί να παραβεί μόνο βαθμίδα.
- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Μη σπένετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του και μετά από βαθύ όργωμα.
- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Δηλώσεις προφύλαξης: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και συσκευη προστασίας ματιών. Διάβασε περιεχόμενο/ περιεκτικότητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τη εφαρμογή.

Φοράτε γάντια, μακριμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανεισδο στην καλλιέργεια.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Ζητείστε ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ξεπλύνετε το στόμα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους πρέπει από τις γειτονικές καλλιέργειες: μίαν αμέσωςτη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **75%**.

Όταν η καλλιέργεια γενιτάζει με κατοικημένη περιοχή, να αφήνετε ζώνη ασφαλείας **10 μέτρων** από αυτή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Prod. Date) } ΒΛΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ (Batch No)



Τρόπος δράσης: Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προφυλακτικά αμέσως μετά την σπορά. Η εφαρμογή να γίνεται με μικρό τύπο σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιόμετρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αμέσως. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολεμά επίθια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Βαμβάκι: Μία εφαρμογή προφυλακτικά αμέσως μετά τη σπορά (BBCH 01-03).

Δόση: 200-400 κ.εκ./στρ.

Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.: 30-50.

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.

2. Σε 7-10 μέρες από την προφυλακτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ, ώστε να «ενεργοποιηθεί» το fluometuron.

3. Μην το χρησιμοποιείτε σε ομαλό εδάφη.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα Αγρωστώδη ζιζάνια:

Μουχρίτσα (*Echinochloa spp.*)

Ευαίσθητα Πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*)*, Αγριομελίτζα (*Xanthium strumarium*), Αγριοταμάρι (*Solanum nigrum*), Αγριοπιπεριά (*Polygonum persicaria*), Αγριο σινάπι (*Sinapis arvensis*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βλήτα (*Amaranthus sp.*), Ζωχοί (*Sonchus sp.*), Ηλιοτρόπιον (*Heliotropium europaeum*)*, Λάπαθο (*Rumex sp.*), Λουβουδιές (*Chenopodium sp.*), Μαρτάκος (*Senecio vulgaris*), Πολυκόμυ (*Polygonum aviculare*), Τάτουλας (*Datura stramonium*), Τριβόλι (*Trifolium terrestris*), Χαμομήλι (*Matricaria recutita*)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Χρωμόφορα (*Chrozothora tinctoria*), Δωδεκάνθη (*Lamium amplexicaule*), Σετάριες (*Setaria sp.*).

*Καταπολεμούνται καλύτερα με τη μεγάλη δόση

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι: Μην εφαρμόζουμε, καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαίσθητος ποικιλίας και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Είναι εκλεκτικό στο βαμβάκι και δεν παροισαεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: --

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενως με τριπλή για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του αvariασιστη συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ηλιακό φως. Στις αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.