

# Indumax®

## Indumax®

Λιπάσμα Π.Π.

Διόρθωση τροφολειτουργιών, επαγωγή της άμυνας των φυτών έναντι των αβιοτικών καταπονήσεων

### ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ % β/β

2% Χαλκός (Cu) συμπλοκοποιημένος υδατοδιαλυτός  
1% Ψευδάργυρος (Zn) συμπλοκοποιημένος υδατοδιαλυτός  
1% Μαγγάνιο (Mn) συμπλοκοποιημένο υδατοδιαλυτό  
Πυκνότητα: 1,3 g/cc  
pH 3,5

### ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Indumax® παρέχει θρεπτικά στοιχεία επιδρώντας διεγερτικά στις βιολογικές διεργασίες του φυτού, αυξάνοντας το ρυθμό και τα παράγωγά τους. Ο χαλκός που περιέχει το Indumax® συμμετέχει στην δημιουργία πρωτεϊνών που επιδρούν στις φυσιολογικές λειτουργίες του φυτού όπως η φωτοσύνθεση, η αναπνοή και η λιγνινοποίηση. Η εφαρμογή του αποτρέπει την εμφάνιση χλωρώσεων, κηλιδώσεων και νέκρωσης των άκρων των νεαρών φύλλων. Το μαγγάνιο συμμετέχει στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής και της παραγόμενης ποσότητας χλωροφύλλης από τα κύτταρα, ενώ ο ψευδάργυρος είναι συστατικό πολλών ενζύμων και συνενζύμων που ρυθμίζουν και ενισχύουν την σύνθεση αυξινών από τα φυτά. Η έλλειψη των παραπάνω ιχνοστοιχείων είναι δυνατό να προκαλέσει τη μείωση της ανάπτυξης των φύλλων και την εμφάνιση μικρότερων μεσογονάτιων διαστημάτων. Ειδικά στα εσπεριδοειδή, συμπτώματα έλλειψης μπορούν να εκδηλωθούν ως χλωρώσεις στη μορφή στιγμάτων στα νεαρά φύλλα και ως μικροκαρπία.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα λιπάσματα. Συνιστάται η εφαρμογή μικρής κλίμακας πριν από την κανονική χρήση.

### ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα. Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά τον εξοπλισμό με απορροή του ψεκαστικού υγρού. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Μην ξεπερνάτε τις συνιστάμενες δόσεις. Εύρος σταθερότητας του συμπλεγμένου κλάσματος pH 2-9.

### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εγγυώμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχό μας, όπως η προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος υπό τις συμβαλλουσες γεωτεχνικού. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβείτε τις συνιστάμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται μακριά από πηγές θερμότητας. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου σε μέρος ασφαλές από υγρασία, νερό και πηγές ανάφλεξης. Αποφύγετε τη συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού. Διατηρήστε το προϊόν στο αρχικό του δοχείο.

### ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Διαφυλλικά: 250-300cc / 100L  
Ριζοτόπια: 300-500cc / στρέμμα



Προϊόν πιστοποιημένο από την CAAE ως "Προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική Γεωργία" σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 834/2007

## ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	1η ΕΦΑΡΜΟΓΗ	2η ΕΦΑΡΜΟΓΗ	3η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ	Στην αρχή της ανθοφορίας. Ενισχύει την ανάπτυξη και την ανθοφορία.	Στην αρχή της καρπόδεσης. Μείωση πτώσης καρπών.	Στην αλλαγή χρωματισμού των καρπών. Ενίσχυση του καρπού.
ΕΛΙΑ	Άνοιξη: Ομοιομορφία της κυτταρικής διαίρεσης.	Καλοκαίρι: Αυξάνει το συγκράτημα των καρπών.	Φθινόπωρο: Ευνοεί την αφομοίωση του καλίου.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ	Στο 90% της πτώσης πετάλων. Αυξάνει το ποσοστό της καρπόδεσης.	15 μέρες μετά. Ενισχύει την ομοιομορφία καρπόδεσης και την πρωίμωξη.	Κατά την αναπτυξη των καρπών. Αύξηση του μέγεθους και της ικανότητας συγκράτησης των καρπών.
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ	Στο 25% άνθησης. Ενίσχυση και ομοιομορφη άνθηση.	Στο 90% πτώσης πετάλων. Ενισχύει την καρπόδεση και την συγκράτηση των καρπών.	Κατά την ωρίμανση. Διόγκωση και συσπικτικότητα του καρπού.
ΜΗΛΙΑ / ΑΧΛΑΔΙΑ	Όταν πέσει το 90% των πετάλων. Ομοιομορφία των βλαστών και προστασία από την ξηρασία.	40 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή. Βελτιώνει την απορρόφηση του καλίου και αυξάνει το μέγεθος του καρπού.	30 ημέρες πριν από τη συλλογή των καρπών. Βελτιώνει της ποιότητας των καρπών και της συσπικτικότητας της επιδερμίδας.
ΑΜΠΕΛΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΣΙΟ	Κατά το στάδιο διόγκωσης των οφθαλμών. Βελτιώνει την ομοιομορφη άνθηση.	Πριν την άνθηση (στάδιο μούρου). Βελτιώνει την καρπόδεση και αποτρέπει την ανωορροφία.	Κατά το δέσιμο των γράνων. Ενίσχυση της παραγωγής και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ	Όταν οι νέοι βλαστοί ξεπεράσουν τα 15 εκ. Ενεργοποίηση των οφθαλμών, ενίσχυση της ανθοφορίας.	Πριν την άνθηση (στάδιο μούρου). Βελτιώνει την καρπόδεση και αποτρέπει την ανωορροφία.	Κατά το δέσιμο των γράνων. Ενίσχυση της παραγωγής και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
ΦΡΑΟΥΛΑ	Κατά τη μεταρύτευση για την ενίσχυση της βλάστησης των νεαρών φυτών και την αναζωογόνηση του ριζικού συστήματος.	Κατά την εμφάνιση του καρπού, για την πρωίμωξη της ωρίμανσης και την δημιουργία νέων καρπών.	Επανάληψη κάθε 10-15 ημέρες.
ΤΟΜΑΤΑ	10 ημέρες μετά την μεταρύτευση. Ενίσχυση της ρίζας και του φυλλώματος.	15 ημέρες πριν την ανθοφορία. Προετοιμασία των ανθέων για καλύτερη καρπόδεση.	Μετά την πρώτη κοπή.
ΠΕΠΟΝΙ ΚΑΡΠΟΥΖΙ	Από το 3ο πράσινο φύλλο. Τονώνει και βοηθά στην πρόληψη καταπονήσεων, ενώ βελτιώνει τη δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.	Στην αρχή της ανθοφορίας. Αυξάνει την ανθοφορία και ενισχύει την ομοιομορφη καρπόδεση, ρυθμίζοντας τον βλαστικό κύκλο.	Μετά την πρώτη κοπή. Αυξάνει την περιεκτικότητα σε σάκαρα (βόμβα βελ).

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
P102 μακριά από παιδιά.  
P264 Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P270 Μην τρίψετε, πινείτε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.  
P305+P351+ P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΘΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.  
P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε φύλλο οδηγιών στην ετικέτα).  
P362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Διαχείριση συσκευασιών σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής  
Παρίδι και ημερομηνία παρασκευής: Βλέπε στη συσκευασία



ELLAGET ABEE  
Θέση Σπυροτόμιας, 196 00  
Μάνδρα Αττικής  
210 5550 431  
www.ellagret.gr  
ellagret@ellagret.gr

**MAFA**bioscience s.a.  
Parque Metropolitano, Avda. de Incar, 30,  
18130, Escuzar, Granada, Spain  
+34 958 337 700  
www.mafa.es / info@mafa.es

1L